

Reporte de cinco casos de Púrpura Trombocitopénico Inmunológico Refractario tratados con Eltrombopag en Hospital Público.

Aranguiz N*, Rojas C, Cuadra L, Díaz J, Toro I, Merino C, Escobar K.

Hospital Dr. Gustavo Fricke Viña del Mar

El Púrpura Trombocitopénico Inmunológico (PTI) es una enfermedad frecuente en nuestra práctica clínica. Un 65 a 70% de los pacientes tratados responderán sólo con corticoides, y que sólo 13 a 17% de los respondedores mantendrán esta respuesta al año. Se investigan nuevas alternativas terapéuticas para pacientes refractarios, dentro de las cuales han tenido gran desarrollo el uso de agonistas de los receptores de trombopoietina como es el caso de Eltrombopag. Siendo un fármaco de demostrada efectividad, su costo hace difícil el acceso en hospitales públicos de Chile. Se deseó reportar nuestra experiencia en 5 pacientes con PTI refractario tratados en un centro hospitalario público.

Pacientes y métodos: Se analizó retrospectivamente la historia clínica de los 5 pacientes con diagnóstico de PTI refractario tratados en la Unidad de Hematología del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar en el último año (2011-2012).

Resultados: Los pacientes que usaron Eltrombopag tenían edades que variaban entre 18 y 83 años. Cuatro de los cinco pacientes eran mujeres. Todos habían sido refractarios a más de dos terapias previas para control de su PTI. Dos habían sido esplenectomizados previamente y en otros dos fue su primera presentación. En un paciente Eltrombopag fue usado como puente para poder realizar esplenectomía. Cuatro de los cinco pacientes alcanzaron respuestas satisfactorias, con un recuento de plaqueta final mayor de 70.000. El tiempo de inicio de respuesta varió entre 5 y 19 días. La respuesta inicial y la mantención de la respuesta se logró con dosis menores a las descritas en la literatura. Un solo paciente no respondió, y presentó un efecto adverso grave secundario presumiblemente al medicamento.

Conclusiones: En la mayoría de los casos, el uso del Eltrombopag permitió un adecuado control de la enfermedad. No obstante el pequeño número de esta serie, creemos que el uso de este medicamento significó un ahorro en días camas, evitar posibles complicaciones, y mejoría en la calidad de vida de los pacientes. La presencia de Efectos Adversos hacen necesario sí una revisión estricta de eventuales contraindicaciones y monitoreo estricto.