Es un PTT??

Dr. Jaime Pereira G.

Departamento de Hematología-Oncología

Escuela de Medicina

Pontificia Universidad Católica de Chile

**JORNADA CHILENA HEMATOLOGÍA
Y MEDICINA TRANSFUSIONAL**

Una historia común....

- Hombre de 25 años
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos con doble cordón por linfoma
- 1 año post-trasplante ingresa por deterioro progresivo de función renal
 - Exámenes de laboratorio
 - Hb: 7.8 g/dL
 - Hto: 24%
 - Esquistocitos: uno que otro por CMA
 - Plaquetas: 34.000/ μ L
 - Creatinina: 2.83 mg/dL
 - LDH 500 U/L
 - Haptoglobina 5.8 mg/dL (normal 36-195)

Es un PTT?

NO

Microangiopatía trombótica asociada a trasplante de precursores hematopoyéticos (MAT-TPH)

Microangiopatías trombóticas

- Púrpura trombótico trombocitopénico
- Síndrome hemolítico urémico
- Enfermedades autoinmunes
 - Esclerosis sistémica
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Síndrome antifosfolípido
 - Hipertensión arterial maligna
 - Preeclampsia
- Infecciones
- Carcinoma metastásico
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Microangiopatías trombóticas

- **Púrpura trombótico trombocitopénico**
- **Síndrome hemolítico urémico**
- Enfermedades autoinmunes
 - Esclerosis sistémica
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Síndrome antifosfolípido
 - Hipertensión arterial maligna
 - Preeclampsia
- Infecciones
- Carcinoma metastásico
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Microangiopatías trombóticas

- **Púrpura trombótico trombocitopénico**
- **Síndrome hemolítico urémico**
- Enfermedades autoinmunes
 - Esclerosis sistémica
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Síndrome antifosfolípido
 - Hipertensión arterial maligna
 - Preeclampsia
- Infecciones
- Carcinoma metastásico
- **Trasplante de progenitores hematopoyéticos**

Microangiopatías trombóticas

Presentación clínica

- Anemia microangiopática (esquistocitosis)
- Trombocitopenia
- Alteraciones bioquímicas
 - Aumento de LDH
 - Disminución de haptoglobina
 - Hiperbilirrubinemia indirecta
 - Hemoglobinuria
- Insuficiencia renal
- Fiebre
- Alteraciones neurológicas

Microangiopatías trombóticas

Presentación clínica

- **Anemia microangiopática (esquistocitosis)**
- **Trombocitopenia**
- **Alteraciones bioquímicas**
 - Aumento de LDH
 - Disminución de haptoglobina
 - Hiperbilirrubinemia indirecta
 - Hemoglobinuria
- **Insuficiencia renal**
- **Fiebre**
- **Alteraciones neurológicas**

Criterios diagnósticos para MAT-TPH

- *Blood and marrow Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN) toxicity committee consensus definition for TMA¹*
 1. Fragmentación de GR; > 2 esquistocitos por campo
 2. Aumento de la LDH
 3. Disfunción renal y/o neurológica sin otra explicación
 4. Coombs directo negativo
- *International Working Group definition for TMA²*
 - Todos los criterios presentes:
 1. > 4% de esquistocitos en la sangre
 2. Trombocitopenia persistente ($<5 \times 10^9/L$) o $\downarrow$ 50% o más de recuento previo
 3. Aumento brusco y persistente de LDH
 4. $\downarrow$ de Hb o aumento de los requerimientos de transfusión de GR
 5. Disminución de la haptoglobina sérica

1. Ho VT et al . *Biol Blood Marrow Transplant* 2005; 11: 571

2. Ruutu T et al. *Haematologica* 2007; 92: 95

Cuerpo de Weibel-Palade

Célula endotelial

P-selectina

1605
1606

Cuerpo de Weibel-Palade

Célula endotelial

P-selectina

Dominio A3

ADAMTS-13
CUB

Dominio A1

Plaqueta
GPIb

Protección normal de trombosis
microvascular:
Rápida escisión de FvW/plaquetas

PTT: Deficiencia de ADAMTS 13
(Adquirida o familiar)

vWF breakdown (normalised ratio)

ADAMTS13 >25%	Referencia
10/10	Elliott et al. Mayo Clin Proc 2003; 78:421
6/6	Arai et al. Hematol J 2001; 2: 292
6/7	Vesely et al. Blood 2003; 101:60

Van der Plas RM et al. Blood 1999; 93: 3798

Factores de riesgo para desarrollo de MAT-TPH

- Edad
- Sexo femenino
- Enfermedad primaria avanzada
- Trasplantes de donantes no relacionados
- Dosis altas de busulfán
- Irradiación corporal total
- Ciclosporina A
- Tacrolimus
- Enfermedad injerto contra huésped aguda
- Infecciones

Manejo de MAT-TPH

- No existe consenso sobre tratamiento efectivo
- No se dispone de ensayos clínico controlados
- Suspensión de drogas
 - Ciclosporina A
 - Tacrolimus
- Plasmaferesis
 - De acuerdo a la fisiopatología → no efecto
 - Unicos datos
 - Requiere mayor N° de procedimientos (>11)
 - Mejores resultados en más leves
 - Mayoría de las muertes por condiciones asociadas

Otras drogas usadas para el tratamiento de MAT-TPH

Tratamiento	Respuesta	Sobrevida global	Comentario
Daclizumab 1mg/kg x 4 semanas	5/13 RC 2/13 RP	4/13	Tratamiento iniciado después de Dg de MAT
Defibrotide 40 mg/Kg/día	5/12 RC 3/12 RP	6/12	Tratamiento iniciado después de Dg de MAT
Rituximab 375mg/m ² /sem/4 dosis	4/5 RC	3/5	Después de falla de plasmaferesis
EPA 1.8 g/día	N/A	7/7	Tratamiento empieza 3 sem antes del Tx
Isosorbide transdérmico 20mg	1/1	1/1	Sin efectos colaterales

5^º CURSO INTERNACIONAL DE AVANCES EN **TROMBOSIS Y HEMOSTASIA**

Organiza:

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Medicina
Departamento de Hematología-Oncología

12 - 13 / Abril 2012

Centro de Convenciones
Hotel Crowne Plaza
Santiago - Chile

Directores del Curso:

Dr. Jaime Pereira G.
Dra. Pamela Zúñiga C.
Dr. Diego Mezzano A.