

## **ANEXO N° 1: GUÍA CRITERIOS SELECCIÓN DONANTES DE SANGRE**

Este documento detalla los criterios actualizados de selección de los donantes de sangre que han sido elaborados por la CNST. Como antecedentes para su realización se revisaron estándares de la AABB, Consejo de Europa y documento de la OPS denominado “Elegibilidad para la donación de sangre”, Washington DC, OPS 2009. Esta guía es un instrumento de base para la construcción de la encuesta que se debe emplear en la entrevista de donantes y por lo mismo puede ser utilizado como material de consulta. • La primera columna detalla la condición clínica, motivo o conducta a evaluar. La segunda columna señala otro criterio como búsqueda de la condición. • La tercera columna detalla la decisión a tomar, ya sea de aceptación o algún tipo de rechazo (temporal o permanente). • La cuarta columna orienta a otras condiciones que se pueden revisar asociadas a la primera columna.



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Aborto	Embarazo Infertilidad		
Absceso	Infección aguda		
Absceso dental	Infección aguda		
Absceso peri amigdaliano	Infección aguda	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- todavía no se ha recuperado</li> <li>- está todavía en estudio</li> <li>- tiene un yeso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfusión</li> <li>- Neurocirugía</li> <li>- Cirugía</li> <li>- Tétano, vacuna</li> </ul>
Accidente		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> una herida o erosión constituyen un riesgo de introducción de bacterias en el torrente sanguíneo. La presencia de bacterias en la sangre o sus componentes es una amenaza grave para quien los recibe. Esto se debe a que las bacterias pueden multiplicarse durante el almacenamiento llegando a niveles peligrosos. Un yeso puede ocultar una herida o erosión.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	
Accidente vascular cerebral			
Acidez	Gastritis Acné		
Acitretin	Psoriasis		



CAUSA DE EXCLUSION	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Acné		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alguna vez ha sido tratado con Etreinato - han transcurrido menos de 12 meses desde el término del tratamiento con Acitretin</li> <li>- han transcurrido menos de 4 meses después de haber recibido Isotretinoína</li> <li>- hay infección secundaria</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-si recibe terapia tópica, tetraciclina oral, eritromicina, etinilestradiol</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>El Etreinato, Acitretin y Isotretinoína pueden causar defectos congénitos en el feto. Es importante dar tiempo a que la droga sea eliminada de la sangre del donante. Algunas drogas demoran más que otras.</p> <p>La infección secundaria del acné generalmente es evidente, con enrojecimiento y tumefacción de las áreas afectadas. Esto constituye un riesgo de que las bacterias entren al torrente sanguíneo. La presencia de bacterias en la sangre es una amenaza grave para quien recibe los productos preparados a partir de ella. Esto se debe a que las bacterias pueden multiplicarse durante el almacenamiento llegando a niveles peligrosos</p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Actividades peligrosas</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- debe realizar esta actividad durante el mismo día</li> <li>- los donantes deben ser advertidos de los riesgos de un desmayo tardío y también de que no deben realizar actividades peligrosas el mismo día</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> si el donante tiene una reacción adversa después de la donación, realizando una actividad peligrosa puede provocarse daño a sí mismo o a otros.</p> <p>Ejemplo de <i>hobbies peligrosos</i> : buceo, paracaidismo, motociclismo, montañismo, etc</p> <p>Ejemplos de <i>ocupaciones peligrosas</i> : controlador de tráfico aéreo, chofer de ambulancia, trabajo en andamios, operadores de grúa o maquinaria pesada, bomberos, conductores de tren o bus, pilotos de avión, mineros, etc</p>	
<p><b>Acupuntura</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la enfermedad subyacente es causal de rechazo</li> <li>- han transcurrido menos de 12 meses de completar tratamiento</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las agujas de acupuntura reutilizadas han estado implicadas en la transmisión de infecciones de una persona a otra.</p> <p>Frente a cualquier duda de transmisión de infección, un plazo de 12 meses permite que la infección sea pesquisada por los tests habituales utilizados por los bancos de sangre.</p>	
<p><b>Addison, enfermedad de</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Adenoma de próstata		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 4 semanas desde el término del tratamiento con Finasteride o 6 meses después de Dutasteride	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Adicción y abuso de drogas</p>		<p><b>OBLIGATORIO : Rechazar si</b>            -Ha usado drogas endovenosas ilegales no prescritas por un médico. <b>Rechazo permanente.</b></p> <p>- si está bajo el efecto de alcohol o drogas. Puede ser hasta la próxima sesión o permanente si su comportamiento puede ser un peligro para el personal u otros donantes.</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>            - si las drogas inyectables fueron prescritas por su médico tratante por una condición que no constituye causal de rechazo</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            La inyección de drogas ha sido vinculada con la transmisión de muchas infecciones, incluyendo la Hepatitis B y el VIH. Puede que pasen muchos años antes de la aparición de la infección y muchos consumidores de drogas no tienen conciencia que pueden ser transmisores de una infección años después de la última vez que consumieron drogas.</p> <p>Cualquiera que esté bajo efectos de alcohol y/o drogas que afecten su razonamiento, no puede dar un consentimiento informado o comprender completamente por qué se le hacen ciertas preguntas. Pueden constituir un peligro para si mismos o los demás.</p>	<p>- Seguridad de la sangre</p>
<p>Aftas orales o vaginales (candidiasis)</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>            - no tienen explicación.            - están relacionadas con inmunodeficiencia.            - han transcurrido menos de 7 días de terminado el tratamiento</p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Alcohol, alcoholismo	Adicción y abuso de drogas	<b>CRITERIO : aceptar</b> <b>OBLIGATORIO :</b>	- Asma - Corticoides
<b>Alergia</b>		<b>Rechazar solo a los individuos con síntomas de alergia sistémica severa (rash generalizado o dificultad respiratoria) en el momento de la donación.</b> <b>Asegurarse que los procedimientos no exponen al donante a sustancias a las que es alérgico (yodo, látex)</b>	
<b>Alergia alimentaria</b>	Alergia		
<b>Amebiasis</b>	Infección aguda		
<b>Amigdalectomía</b>	Cirugía		
<b>Amigdalitis</b>	Infección general		
<b>Anabólicos</b>	Adicción y abuso de drogas		
<b>Analgésicos</b>		<b>Evaluar la razón de la indicación y dirigirse al casillero correspondiente.</b> <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han sido indicados para una enfermedad grave de largo plazo.	- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Andinismo	Actividades peligrosas	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el examen de Hto o Hb pre donación está bajo valores aceptados.</li> <li>- está en estudio o tratamiento.</li> </ul> <p><b>A CRITERIO :</b></p> <p><b>Historia de anemia: aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si fue por deficiencia de fierro y actualmente no está en estudio y han transcurrido 6 meses o más desde la finalización del tratamiento y recuperación de los depósitos.</li> <li>- si se trató de otros tipos de anemia, <b>aceptar o excluir</b> según estas Guías o referir a Médico Responsable de Donantes</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Donar sangre hace descender los niveles de hemoglobina. Para las personas con historia de anemia puede ser más difícil sobreponerse a esta pérdida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Transfusión</li> <li>- Hemoglobina, alteraciones</li> <li>- Hemoglobina, determinación</li> </ul>
Anemia			



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Anestesia		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la enfermedad por la que recibió la anestesia es causal de rechazo</li> <li>- hay riesgo de infección</li> <li>- han pasado menos de 24 horas desde la anestesia</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Un tratamiento que requiera cualquier nivel de sedación debe ser rechazado por un período mínimo de 24 horas. Esto es para asegurar que el consentimiento y las respuestas del donante son válidos. Puede ser necesario diferir la donación por un período mayor debido a la naturaleza del procedimiento o a la enfermedad subyacente. Los procedimientos que requieren anestesia local habitualmente requieren períodos más largos de rechazo debido a riesgos de infección asociados, (cirugía menor, curaciones, tratamiento dental, etc)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente</li> <li>- Dental, tratamiento</li> <li>- Endoscopia</li> <li>- Cirugía</li> <li>- Transfusión</li> </ul>
Anestesia general	Anestesia		
Anestésico local	Anestesia	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Una historia de angina significa que el donante tiene enfermedad coronaria. La extracción de sangre puede ponerlo en riesgo de un infarto cardíaco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedad cardiovascular</li> </ul>
Angina de pecho			



CAUSA DE EXCLUSION	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Ansiedad		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta sintomas relacionados con el tratamiento o con la enfermedad subyacente</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se encuentra bien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades mentales</li> <li>- Beta bloqueadores</li> </ul>
Ansiolíticos	Ansiedad	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha presentados sintomas en relación al tratamiento</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si el donante está bien y está recibiendo reemplazo nicotínico (parches, spray) o Bupropion</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Los tratamientos antitabaco pueden provocar mareos y náuseas. Al extraer sangre a personas afectadas, esto puede empeorar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acupuntura</li> </ul>
Anti tabaco, tratamiento		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- está en estudio</li> <li>- tiene diagnóstico de úlcera péptica activa</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si los toma de manera ocasional para acidez. Esto incluye antagonistas de receptores H2 e inhibidores de bomba de protones</li> </ul>	
Antiácidos			



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Antibióticos	Infección general	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>- está en tratamiento anticoagulante.</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si el tratamiento terminó hace más de 7 días y se identificó una causa de trombosis venosa profunda aislada u otra condición que por sí misma no es de exclusión obligatoria.</p>	<p>- Enfermedad cardiovascular</p> <p>- Trombosis</p>
Anticoagulantes		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>El tratamiento anticoagulante hará que el donante tenga más posibilidades de presentar sangramiento o hematoma después de la donación. El efecto del tratamiento desaparece en unos días y a los 7 días los mecanismos de la coagulación deberán estar restablecidos.</p> <p>Si el donante tiene una enfermedad cardiovascular, la extracción de sangre lo puede poner en riesgo de un problema cardíaco.</p>	
Anticonceptivos (implante, píldora, inyección)		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Anticonvulsivantes		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- son usados para tratamiento de epilepsia</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si los utiliza para tratar un trastorno bipolar o síndromes de dolor crónico y la enfermedad subyacente no es causal de exclusión</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Si una persona que sufre de epilepsia se desmaya después de la donación, puede terminar en una crisis epiléptica.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene síntomas de depresión o manía</li> </ul> <p><b>A CRITERIO :</b> el tratamiento regular no contraindica la donación</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las personas que están depresivas o maníacas no siempre pueden dar un consentimiento informado válido o comprender completamente por qué se le hacen ciertas preguntas. Si los síntomas son controlados por el tratamiento, el donante puede donar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epilepsia</li> <li>- Enfermedades mentales</li> </ul>
Antidepresivos		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene síntomas de depresión o manía</li> </ul> <p><b>A CRITERIO :</b> el tratamiento regular no contraindica la donación</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las personas que están depresivas o maníacas no siempre pueden dar un consentimiento informado válido o comprender completamente por qué se le hacen ciertas preguntas. Si los síntomas son controlados por el tratamiento, el donante puede donar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades mentales</li> </ul>
Antihipertensivos	Hipertensión arterial		
Antihistamínicos		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Alergia
Antiinflamatorios			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</li> <li>- Corticoides, terapia</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)		<p><b>Evaluar</b> la razón de la indicación y dirigirse al casillero correspondiente.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han sido indicados por una enfermedad grave de largo plazo incluyendo enfermedad cardiovascular</li> <li>- <b>plaquetas</b>: no se pueden preparar plaquetas si el donante ha recibido aspirina o piroxicam en los últimos 3 días o ha recibido otros AINES en las últimas 48 horas. (ver Medicamentos que Pueden Afectar la Función Plaquetaria)</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si los recibe por automedicación y el donante cumple con el resto de los requisitos</li> </ul>	<p>- Medicamentos que Pueden Afectar la Función Plaquetaria</p>
Antimicóticos generales	Infección general	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han transcurrido menos de 2 semanas de finalizado el tratamiento</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Se ha descrito un posible efecto teratogénico</p>	
Antioesidad, tratamiento		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Peso
Antivirales	Infección general		
Ántrax	Infección aguda		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<b>Ántrax, exposición</b>		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si el donante está bien, aunque esté con antibióticos profilácticos</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            La infección por ántrax afecta con mayor frecuencia la piel a través del contacto con elementos infectados, como piel de animales. Si se han inhalado esporas no hay evidencias del paso al torrente sanguíneo hasta que la persona ha desarrollado signos de infección. Por esta razón, si es que el donante se encuentra bien se considera seguro aceptarlo tras una exposición, aún si le ha indicado antibióticos profilácticos,</p>	
<b>Antrax, vacunación</b>	Vacunas		
<b>Apendicectomía</b>	Cirugía		
<b>Arritmias</b>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>            - está sintomático o en etapa de estudio.  <b>EN TODOS LOS OTROS CASOS</b> referir al Médico Responsable de Donantes</p>	- Enfermedades cardiovasculares
<b>Arteritis temporal</b>		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
<b>Articulación, inyección</b>	Corticoides		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Artritis			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espondilitis anquilosante</li> <li>- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</li> <li>- Osteoartritis</li> <li>- Psoriasis</li> <li>- Artritis reumatoide</li> </ul>
Artritis psoriática		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psoriasis</li> </ul>
Artritis reumatoidea		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la enfermedad está activa y bajo tratamiento con corticoides u otros</li> <li>- forma parte de una enfermedad sistémica</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es leve y el único tratamiento son antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discapacidad</li> <li>- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</li> <li>- Corticoides</li> </ul>




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Asma		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta síntomas</li> <li>- está tomando corticoides orales o los ha tomado en los últimos 7 días</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si al momento de la donación está asintomático, aún si está con tratamiento preventivo</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Al realizar una extracción de sangre a una persona con asma sintomática la cantidad de oxígeno circulante descenderá y puede empeorar.</p> <p>La terapia con corticoides puede enmascarar los signos y síntomas de una infección. La sangre proveniente de un donante infectado puede ser peligrosa para quien la reciba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infección general</li> <li>- Corticoides</li> </ul>
Aspirina	Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)		
Ataques	Epilepsia		
Ataque cardiaco	Enfermedad cardiovascular		
Ausencias	Epilepsia		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Autocaterismo		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            Los donantes que requieran autocaterización pueden tener bacteremias tras el procedimiento. Las bacterias en la donación pueden llevar a reacciones transfusionales muy graves e incluso fatales.</p>	
Autoimmune, enfermedad		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>            - el donante ha recibido tratamiento para suprimir la condición de autoinmunidad en los últimos 12 meses</p> <p><b>Ver si hay un casillero específico para la enfermedad</b></p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            Las enfermedades autoinmunes se deben a que el sistema inmune genera respuesta contra sus propios tejidos. Esto sucede por la presencia de anticuerpos en la sangre (plasma) y por células inmunes que atacan de manera directa a células blanco de los órganos afectados.</p> <p>La transfusión de anticuerpos o el traspaso de células inmunes en la sangre o tejidos pueden provocar daños similares en los pacientes receptores.</p>	<p>- Transfusión si ha sido tratado con inmunoglobulina o plasmaféresis</p>
AVC (Accidente Vascular Cerebral)		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	
Medicamentos que contenga Dutasteride	Dutasteride		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Babesiosis	Infección crónica	<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
BCG		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el sitio de inoculación no ha sanado</li> <li>- han pasado menos de 8 semanas desde la inoculación</li> </ul> <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> El BCG es una vacuna con bacterias vivas. En 8 semanas, la infección causada por la inoculación debería estar controlada. Si la herida no ha sanado es posible que la infección aún esté presente y existe el riesgo de traspasar BCG u otras infecciones a receptores de sangre o tejidos.	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Beta bloqueadores		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han sido indicados por una enfermedad cardiovascular</li> <li>- han sido indicados para controlar los síntomas de una enfermedad tiroídea</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se usan para enfermedades no cardiovasculares o el donante tiene una hipertensión controlada</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Los beta bloqueadores con frecuencia se usan para tratar enfermedades cardíacas graves como enfermedad coronaria o arritmias. También pueden usarse para controlar los síntomas asociados a un tiroídes hiperfuncionante. Las personas en estos casos <b>no deben donar.</b></p> <p>También se usan con frecuencia como tratamiento para la hipertensión. Hay evidencias que los donantes tomando beta bloqueadores no tienen una mayor incidencia de reacciones adversas relacionadas con la donación.</p> <p>Son utilizados también para tratar muchas otras alteraciones como la jaqueca, el temblor, la ansiedad y el glaucoma. En la mayoría de los casos esto no debería impedir la donación. Actualmente hay estudios publicados que demuestran que es seguro extraer sangre a donantes usando beta bloqueadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedad</li> <li>- Hipertensión arterial</li> <li>- Jaqueca</li> </ul>
Bilharzia	Infección aguda		
Biopsia de mama	Cirugía		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Bipolar, enfermedad	Enfermedades mentales		
Bisfosfonato, difosfonato			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cáncer</li> <li>- Osteoporosis</li> <li>- Paget, enfermedad ósea de</li> </ul>
Bocio	Tiroides, enfermedades		
Bomberos	Actividades peligrosas		
Borreliosis	Infección aguda		
Botulínica Toxina	Terapias alternativas		
Botulismo		<b>OBLIGATORIO : no debe donar hasta 2 años después de desaparecido el cuadro</b>	
Botulismo, vacunación	Vacunas		
Bronquitis aguda	Infección aguda		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Bronquitis crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - presenta ataques regulares de tos y secreción - tiene disnea de reposo o a mínimos esfuerzos  <b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Infección general - Corticoides
Brucelosis		<b>INFORMACION ADICIONAL :</b> La brucelosis es una infección causada por una bacteria intracelular que puede ser muy difícil de erradicar. Ha sido transmitida por transfusión y trasplante y es muy difícil establecer un plazo en el cual la persona se pueda considerar no infectante.	
Buceo	Actividades peligrosas		
By pass	Enfermedad cardiovascular		
Cálculos biliares	Vesícula, enfermedad		
Cálculos renales	Cólico renal		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Cambio de sexo		<p><b>A CRITERIO</b> : la evaluación de la hemoglobina debe hacerse según el nuevo género asignado</p>	<p>- Cirugía -Conducta Sexual de Riesgo</p>
Cáncer		<p><b>OBLIGATORIO</b> : no debe donar</p> <p><b>A CRITERIO</b> : aceptar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se trata de un Carcinoma Basocelular y completo tratamiento</li> <li>- si se trata de Cáncer Cérvicouterino in Situ (NIE), completo tratamiento y los PAP de control no muestran células anormales en el último año</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL</b> :</p> <p>Muchas enfermedades malignas se diseminan a través del torrente sanguíneo. Igualmente algunos virus que se diseminan por la sangre pueden causar enfermedades malignas. Por esta razón se considera más seguro no aceptar sangre de personas que han tenido un cáncer.</p> <p>Debido a que el Carcinoma Basocelular no se disemina a través de la sangre, las personas tratadas exitosamente pueden donar. Por definición, el Cáncer Cérvicouterino in Situ no se ha extendido más allá del cuello uterino. Las mujeres tratadas exitosamente pueden donar.</p>	<p>- Carcinoma Basocelular - Cáncer Cérvicouterino in Situ</p>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Cáncer cervicouterino, in situ		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>- está en estudio o tratamiento</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si el estudio y tratamiento han concluido. Aceptar si está con PAP periódicos de control y no están alterados</p>	
Cáncer de piel	Cáncer		
Cándida	Aftas orales o vaginales	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>- está en tratamiento</p> <p>- tiene una herida aún no curada</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Aun cuando el Carcinoma Basocelular es un tipo de cáncer, sólo se disemina de manera local. Al no diseminarse por el torrente sanguíneo no constituye un riesgo para los receptores de sangre o tejidos.</p>	
Carcinoma basocelular		<p>Una herida abierta es un riesgo de ingreso de bacterias a la sangre. Las bacterias son una seria amenaza para cualquiera que reciba la sangre, componentes o tejidos. Esto es porque las bacterias se pueden reproducir durante el almacenamiento hasta niveles peligrosos.</p>	
Cardiomiopatía		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Cefalea ocasional		<b>A CRITERIO : aceptar</b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - no ha sido estudiada	- Jaqueca
Cefalea recurrente		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si ha sido estudiada y el diagnóstico no contraindica la donación	
Ceguera	Discapacidad		
Celíaca, enfermedad		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Celulitis	Infección general		
Cesárea	Embarazo		
Chagas, enfermedad	Infección crónica	<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Chikungunya, virus		<p><b>DEFINICION :</b> las áreas Riesgo de Enfermedades según <i>Ubicación Geográfica</i></p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha retornado hace menos de 6 meses de una zona endémica y se le diagnosticó la enfermedad o ha presentado síntomas sugerentes</li> <li>- han pasado menos de 4 semanas del retorno de zona endémica</li> </ul> <p><b>A CRITERIO :</b> aceptar todos los donantes después de 6 meses del retorno de área endémica, si no hay síntomas o evidencias de infección</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>El virus Chikungunya es un alfavirus que puede causar un amplio rango de enfermedades, desde un cuadro asintomático hasta la muerte. Lo más frecuente es que cause artritis (rodilla, tobillo, y pequeñas articulaciones de las extremidades), fiebre y rash maculopapular.</p> <p>Está ampliamente diseminado, pero ha alcanzado niveles de epidemia en la India e islas del Océano Índico desde el 2005. Se sabe que se disemina por la sangre, por lo que en teoría se podría transmitir por transfusión o trasplante de tejidos y órganos de personas asintomáticas. Se disemina por los mismos mosquitos que el dengue.</p> <p>Como el problema varía tanto en relación con la geografía como la época del año, no se puede establecer un área de la cual los donantes deban ser rechazados y fechas de actividad de la enfermedad.</p>	<p>Riesgo de Enfermedades según <i>Ubicación Geográfica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malaria</li> <li>- Infección tropical</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Chofer	Actividades peligrosas		
Christmas, enfermedad	Coagulación, trastornos		
Cirrosis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Adicción y abuso de drogas



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p style="text-align: center;"><b>Cirugía</b></p>		<p><b>DEFINICIÓN:</b>  <b>Cirugía mayor :</b> Todo procedimiento quirúrgico que requiere una estadia hospitalaria de más de 5 días  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la cirugía se debió a un cáncer</li> <li>- no han sanado todas las heridas</li> <li>- hay cualquier infección</li> <li>- no se ha restablecido la movilidad normal</li> <li>- han transcurrido menos de 12 meses de una cirugía mayor</li> <li>- han transcurrido menos de 7 días de cualquier otra cirugía</li> <li>- si requiere tratamiento post operatorio o atención hospitalaria regular</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se debió a un cáncer cervicouterino in situ o carcinoma basocelular y cumple todos los otros requisitos para donar</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  La cirugía puede causar una pérdida importante de sangre. Es importante que los donantes que van a ser operados no sean puestos en riesgo de anemia por baja de sus depósitos de fierro al someterlos a una donación previa a su cirugía. A menos que sea improbable que la cirugía provoque una pérdida considerable de sangre, la donación debe ser diferida hasta después de planificada la cirugía. Esto disminuirá la posibilidad de ser transfundido, lo que le impediría seguir siendo donante de sangre. También es importante no dificultar la recuperación del donante. Esto implica esperar hasta que esté completamente recuperado antes de volver a donar.  La cirugía puede poner al donante en riesgo de infección ya sea por las heridas o por riesgo de infección desde el personal o de equipos infectados. Aunque estos riesgos son muy bajos es importante esperar el tiempo suficiente para que los riesgos hayan desaparecido o hasta que los exámenes realizados por el Centro de Sangre puedan pesquisar cualquier infección que pueda haber sido transmitida al donante a través de la Cirugía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anestesia</li> <li>- Cáncer cervicouterino in situ</li> <li>- Cáncer basocelular</li> <li>- Endoscopia</li> <li>- Neurocirugía</li> <li>- Receptores de órganos o tejidos</li> <li>- Transfusión</li> <li>- Xenotransplante</li> </ul>




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Cirugía cardíaca		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO :</b> derivar a Médico Responsable de Donantes si se trató de una cardiopatía congénita, no tiene incapacidad residual, no requiere antibióticos preventivos, y no está excluido por transfusión.</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            En los individuos que han sido sometidos a una cirugía cardíaca, salvo las cardiopatías congénitas, extraer un volumen importante de sangre puede ser peligroso. Los donantes que han sido sometidos a cirugía cardíaca debido a un defecto congénito, generalmente pueden desarrollar una vida normal y pueden donar sangre de manera segura. El Médico Responsable de Donantes puede decidir su aceptación basándose en su historia médica, y si cumple con los requisitos enunciados en <b>"A CRITERIO"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedad cardiovascular</li> <li>- Endocarditis bacteriana subaguda</li> <li>- Cirugía</li> <li>- Transfusión</li> </ul>
Cirugía cerebral	Neurocirugía		
Cistitis	Infección general		
Citomegalovirus	Infección general		
Clamidia	Infección aguda		
Claudicación intermitente		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Clomifeno	Infertilidad	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha sido tratado con concentrados derivados del plasma</li> <li>- hay historia de sangramiento excesivo o hematomas</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las personas que han recibido concentrados de factores de coagulación derivados de la sangre (que se fabrican con sangre proveniente de cientos de donantes) pueden haber estado en riesgo de adquirir una infección transmisible por la sangre.</p> <p>Si alguien ha tenido problemas de sangramiento o hematomas puede ser perjudicial realizarle una extracción de sangre.</p> <p>Algunas personas con estado de portador de algunos trastornos de coagulación (rasgo) pueden estar en riesgo de sangramiento.</p> <p>Además si con su sangre se fabrica plasma fresco congelado, este puede no tener cantidad suficiente del factor de coagulación para el paciente que lo va a recibir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfusión</li> <li>- Coagulación, trastornos : familiares o cuidadoras</li> </ul>
<p><b>Coagulación, trastornos familiares o cuidadoras</b></p>		<p><b>A CRITERIO : aceptar si no es pareja sexual y no ha tenido accidentes cortopunzantes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herida por inoculación</li> </ul>




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Coagulación, trastornos : pareja sexual de pacientes tratados con concentrados derivados del plasma</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si han pasado más de 12 meses del último contacto sexual.</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las personas que han recibido concentrados de factores de coagulación derivados de la sangre (que se fabrican con sangre proveniente de cientos de donantes) pueden haber estado en riesgo de adquirir una infección transmisible por la sangre. Esta pudo haberse transmitido a su pareja sexual.</p> <p>Esperar 12 meses desde el último contacto sexual permite que la calificación microbiológica pesquise una posible infección.</p>	<p>- Herida por inoculación</p>
Codo de tenista			- Corticoides
Colecistectomía	Cirugía		
Colecistitis	Vesícula, enfermedad		
Cólera, vacunación	Vacunas		
Colesterol elevado	Hipercolesterol emia		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Cólicos renales		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - está sintomático - está en estudio  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se ha recuperado o tiene cálculos asintomáticos	- Infección general
Colitis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - tiene historia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si han transcurrido más de 2 semanas de un episodio de colitis infecciosa	- Infección general - Enfermedad intestinal inflamatoria
Colitis ulcerosa	Enfermedad intestinal inflamatoria	<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Colon irritable inflamatorias		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Colostomía		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - fue realizada por un cáncer o enfermedad intestinal inflamatoria  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si la razón de la colostomía no es causal de exclusión y el ostoma está sano	- Cirugía
Columna, cirugía			- Neurocirugía - Cirugía




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Columna, problemas		<b>OBLIGATORIO :</b> Chequear si hay un casillero específico para la enfermedad  <b>No debe donar si</b> - tiene dificultad para subirse o bajarse de la camilla	- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
Concentrados para coagulación	Coagulación, trastornos		
Condromalacia		<b>A CRITERIO : aceptar</b> <b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Seguridad de la sangre
<b>CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- La persona involucrada en conducta sexual de riesgo, es decir más de una pareja en los últimos 12 meses debe ser rechazada como donante de sangre, independiente de la orientación sexual</li> <li>- Si han transcurrido menos de 6 meses del inicio de una nueva pareja sexual.</li> </ul> <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Esperar 12 meses desde el último contacto sexual permite que el laboratorio pesquise una posible infección.  <b>CRITERIO : aceptar</b> - Una pareja estable. - si han transcurrido 12 meses desde el último contacto sexual con segunda pareja.	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Como biopsia	Cáncer cervicouterino, in situ		
Contacto con enfermedades infecciosas	Enfermedades infecciosas, contacto		
Controlador de tráfico aéreo	Actividades peligrosas		
Corea de Huntington	Huntington, enfermedad de		
Corticoides (periarticular, inyección, comprimidos)		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- están indicados por un desorden multisistémico</li> <li>- están indicados por artritis inflamatoria generalizada</li> <li>- los está recibiendo de manera regular en tabletas, inyecciones, enemas o de manera tópica en grandes áreas</li> <li>- han transcurrido menos de 7 días de completado un tratamiento de corticoides orales o inyectables</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uso ocasional de cremas en pequeñas áreas de la piel</li> <li>- uso profiláctico de inhalador de corticoides</li> </ul> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha recibido alguna vez hormona de crecimiento de origen hipofisiario</li> </ul>	<p>- Enfermedades asociadas a priones</p>
Crecimiento, hormona		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si ha sido tratado exclusivamente con hormona recombinante</li> </ul>	
Cremas de piel	Medicamentos tópicos		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Creutzfeldt Jakob v, enfermedad	Enfermedades asociadas a priones		
Crohn, enfermedad	Enfermedad intestinal inflamatoria		
Déficit de G6PD		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Déficit de factor IX	Coagulación, trastornos	<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Déficit de piruvato- kínasa		<b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Esta es una deficiencia enzimática del glóbulo rojo que provoca que los glóbulos se destruyan con mayor facilidad durante el almacenamiento y la sangre puede ser peligrosa para la transfusión.	
Déficit de factor VIII	Coagulación, trastornos		
Demencia		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Dengue	Infección aguda		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Dental, tratamiento		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han pasado menos de 7 días de una endodoncia o una extracción</li> <li>- han pasado menos de 24 horas de una obturación o pulido</li> <li>- si presenta heridas que no han sanado</li> <li>- si hay signos de infección</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si sólo se trató de una consulta o realización de un molde</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las extracciones y otros tratamientos dentales pueden provocar la introducción de bacterias al torrente sanguíneo. Los plazos propuestos permiten que las lesiones sanen y que si alguna bacteria ingresó a la sangre ya haya sido eliminada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cirugía</li> <li>- Infección</li> </ul>
Deportes	Actividades peligrosas		
Depresión	Antidepresivos		
Dermatitis		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta lesiones en sitio de punción</li> <li>- está usando terapia sistémica</li> <li>- hay signos de infección</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si el área afectada es pequeña, no afecta el sitio de punción y sólo recibe terapia tópica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infección general</li> <li>- Corticoides</li> </ul>
Dermatitis pustulosa contagiosa	Infección aguda		



<b>CAUSA DE EXCLUSIÓN</b>	<b>DIRIGIRSE A</b>	<b>DECISION A TOMAR</b>	<b>VER, SI CORRESPONDE</b>
Desmayos		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  tiene historia de un desmayo severo o 2 desmayos consecutivos</p> <p><b>A CRITERIO :</b>  si se decide aceptar se requiere una observación cuidadosa</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  Una historia de predisposición a desmayos aumenta las posibilidades de una reacción adversa a la donación</p>	
Diabetes insípida		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Diabetes mellitus</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) requiere tratamiento con insulina</li> <li>b) los medicamentos han sido modificados en las últimas 4 semanas</li> <li>c) ha presentado mareos, desmayos o se siente débil</li> <li>d) ha tenido problemas cardíacos o oftalmológicos producto de su diabetes.</li> <li>e) presenta insuficiencia renal en estudio o tratamiento</li> <li>f) ha requerido cirugía por obstrucción arterial, incluyendo amputación</li> <li>g) tiene o ha tenido gangrena</li> <li>h) tiene o ha tenido úlceras o heridas relacionadas con alteraciones de la sensibilidad</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) si se ha diagnosticado prediabetes o diabetes gestacional y no requiere tratamiento</li> <li>b) si se controla bien solo con dieta y medicamentos orales que no han sido modificados en tipo o dosis en últimas 4 semanas</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La diabetes es una condición frecuente y la mayoría de las personas que la padece no requiere insulina (diabetes tipo 2), están en buen estado de salud y son aptas para la donación. Sin embargo es de la mayor importancia evaluar cuidadosamente las complicaciones debidas a la diabetes y que se impida la donación cuando sea necesario (p.e. personas con riesgo de desmayo por neuropatías autonómicas o bacteremia debida a úlceras no resueltas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infección general</li> <li>- Enfermedad cardiovascular</li> <li>- Enfermedades neurológicas</li> <li>- Claudicación intermitente</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Diarrea		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es un cuadro crónico o está asociada a enfermedad intestinal inflamatoria - han transcurrido menos de 1 semana desde su recuperación total	- Infección general
Dificultad de comunicación		<b>OBLIGATORIO :</b> <b>todos los donantes deben:</b> - comprender completamente el proceso de donación - dar su consentimiento informado al proceso y a los exámenes a que será sometida su sangre  <b>Intérpretes:</b> Si es necesario que estén presentes durante alguna fase confidencial de la selección de donantes deben comprender los requerimientos de la Seguridad de la Sangre y no ser conocidos del donante	- Discapacidad
Difteria	Infección aguda		
Difteria, vacunación	Vacunas		
Digoxina		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Discapacidad		<p><b>OBLIGATORIO :</b>  <b>todos los donantes deben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprender completamente el proceso de donación</li> <li>- dar su consentimiento informado al proceso y a los exámenes</li> <li>- ser capaces de usar las instalaciones sin peligro de daño para ellos u otros (no se debe realizar una extracción en una silla de ruedas)</li> </ul> <p><b>Intérpretes:</b>  Si es necesario que estén presentes durante alguna fase confidencial de la selección de donantes, deben comprender los requerimientos de la Seguridad de la Sangre y no ser conocidos del donante</p> <p><b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>  Un profesional de la salud calificado puede ayudar a un donante a llenar el cuestionario, a leer y comprender el consentimiento informado y cualquier otra información proporcionada por el Centro de Sangre. Está permitido utilizar formatos alternativos como Braille, audio, computador u otros idiomas. El donante debe demostrar claramente que comprendió todo el material entregado y esto será evaluado según el juicio del profesional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autocaterización</li> <li>- Espina bífida</li> </ul>
Displasia cervical	Cáncer cervicouterino, in situ		
Distrofia muscular			- Discapacidad



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Diuréticos		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - si su uso se debe al tratamiento de un síndrome premenstrual o a una hipertensión como droga única o asociada a Beta bloqueadores</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Varios estudios han demostrado que los beta bloqueadores no aumentan el número de reacciones adversas asociadas a la donación de sangre</p>	- Hipertensión arterial
Diverticulosis		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Infección general
Dolor de pecho	Enfermedad cardiovascular		
Donante de órganos		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Transfusión - Cirugía
Drepanocitosis	Hemoglobina, alteraciones	<p><b>OBLIGATORIO :</b> <i>Donante de componentes celulares:</i> No debe donar</p>	
Drepanocitosis, rasgo		<p><i>Donante de sangre total :</i> - no apta para uso intrauterino o neonatal</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - sólo si es para uso en adultos</p>	
Drogas para aumentar masa muscular	Adicción y abuso de drogas		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Dutasteride (Medicamentos que contienen el principio activo y destinados al tratamiento del adenoma de próstata)		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 6 meses de concluido el tratamiento	
Eczema	Dermatitis		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Edad</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO :</b></p> <p><b>Aceptar:</b></p> <p><b>Donante de sangre total :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rango de 18 a 60 años.</li> </ul> <p>Si es donante habitual mayor de 60 años se debe evaluar la condición clínica por médico.</p> <p><b>NO DEBE DONAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es donante de primera vez mayor de 60 años.</li> </ul> <p><b>Donante de Plaquetas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es menor de 18 años.</li> <li>- si ha presentado efectos adversos después de donar sangre.</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Los límites inferiores se basan en las leyes de mayoría de edad. Los límites superiores tradicionalmente se han establecido para proteger la salud del donante. Sin embargo hay poca evidencia que sostenga esto. Siempre que los donantes mayores permanezcan en buena salud pueden aceptarse si cumplen con los requerimientos de estas guías. Como todos los donantes, debe evaluarse su aptitud para donar cada vez que acudan.</p>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Ejercicio	Actividades peligrosas		
Electrolisis		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Elipctocitosis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha requerido esplenectomía <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no ha requerido esplenectomía <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - hay embarazo - si se trató de embarazo molar invasivo - si se trató de embarazo molar no invasivo que está bajo tratamiento y estudio Diferir por un periodo de seis meses post parto con o sin lactancia.	- Cirugía - Transfusión
<b>Embarazo</b>		<b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Durante el embarazo, especialmente en los últimos meses, una cantidad importante de hierro es transferida de la madre al feto. Es importante dar tiempo para que este hierro perdido sea reemplazado a través de la dieta.	
<b>Embarazo ectópico (tubario)</b>	Embarazo		
<b>Embolia pulmonar</b>	Trombosis		
<b>Encefalitis</b>	Infección general		
<b>Encefalomielitis mialgica</b>	Fatiga post viral, síndrome		


CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Endocarditis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - hay infección activa - tiene una afección cardiaca y requiere antibióticos profilácticos para sus tratamientos dentales	- Infección general
Endometriosis		<b>A CRITERIO : aceptar</b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses de un examen con endoscopio flexible (la gran mayoría de ellos)	- Cirugía
Endoscopia		<b>A CRITERIO : aceptar</b> Si el examen se hizo con endoscopio rígido (proctoscopio, colposcopio) el paciente está bien y no está a la espera de resultados de exámenes  <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Los endoscopios flexibles pueden ser difíciles de desinfectar. Se han reportado casos de traspaso de una infección de persona a persona a través de un examen o biopsia usando este tipo de instrumento.	
Enfermedad cardiovascular		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - tiene una enfermedad cardiaca isquémica - tiene trombosis o tromboflebitis recurrentes  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si sólo tiene prolapso asintomático de la válvula mitral	- Angina de pecho - Hipertensión arterial - Endocarditis bacteriana subaguda - Trombosis



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Enfermedad gastrointestinal		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - tiene Enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa - tiene cáncer  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - otras enfermedades, considerando la exclusión de aquellos donantes que pueden tener fierro bajo por pérdida de sangre - enfermedad celíaca	- Diarrea
Enfermedad intestinal inflamatoria		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha tenido más de un episodio - han transcurrido menos de 2 años de cualquier evento sintomático - requiere antibióticos profilácticos para sus tratamientos dentales  <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> La enfermedad reumática puede causar daño a las válvulas cardíacas haciendo insegura la donación de sangre.	
Enfermedad reumática			




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Enfermedades asociadas a priones</b> (incluye enfermedad de Creutzfeldt Jakob esporádica familiar y variante, enfermedad de Gertsman-Straussler - Scheinker e insomnio familiar fatal)</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha tenido un diagnóstico de cualquier forma de enfermedad de Creutzfeldt Jakob u otro trastorno asociado a priones</li> <li>- está en riesgo de desarrollar un trastorno asociado a priones.</li> </ul> <p>Esto incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuos en riesgo familiar de enfermedades asociadas a priones (ha tenido 2 o más familiares que han desarrollado una enfermedad asociada a priones o han sido informados que están en riesgo después de consejería genética)</li> <li>- individuos advertidos de estar en riesgo después de estar sometidos a cirugía, transfusión o trasplante</li> <li>- individuos advertidos que pueden estar en riesgo ya que un receptor de su sangre o tejidos ha desarrollado un trastorno asociado a priones</li> <li>- receptores de injertos de duramadre</li> <li>- receptores de injertos de córnea o esclera</li> <li>- receptores de extractos de hormona hipofisaria</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si el donante ha tenido 2 familiares consanguíneos que han desarrollado una enfermedad asociada a priones y luego de consejería genética ha sido informado que no tiene riesgo.</li> </ul>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Enfermedades de Transmisión Sexual		<p><b>OBLIGATORIO</b>  <b>Chequear</b> si existe un casillero específico para la enfermedad</p> <p><b>No debe donar si :</b>  - han transcurrido menos de 12 meses desde el término del tratamiento completo</p> <p><i>Pareja sexual</i>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - el donante requirió tratamiento y no han pasado 12 meses desde el término del tratamiento  - el donante no requirió tratamiento y no han pasado 12 meses desde el último contacto sexual con la pareja infectada</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - requiere tratamiento de mantención  - no es capaz de comprender y consentir con el proceso de donación y la realización de exámenes</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si está en tratamiento estable para depresión o enfermedad bipolar y no está ni deprimido ni maníaco</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad de la sangre</li> <li>- Verrugas genitales</li> <li>- Herpes genital</li> <li>- Sífilis</li> </ul>
Enfermedades mentales		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  Muchas personas tienen problemas de salud mental que se pueden controlar con medicamentos. Siempre que las personas con depresión o enfermedad bipolar se encuentren con tratamiento estable y estén bien el día de la donación, pueden donar sin importar el tipo de medicamento que estén recibiendo.</p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Enfermedades infecciosas, contacto		<p><b>OBLIGATORIO</b>  <b>Chequear</b> si existe un casillero específico para la enfermedad con la que se ha tomado contacto  <b>No debe donar si :</b>  - está durante el periodo de incubación o, si este no se conoce, han transcurrido menos de 4 semanas del último contacto</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si hay una historia confirmada de infección previa con la enfermedad que ha ocurrido el contacto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hepatitis</li> <li>- Infección general</li> <li>- Meningitis</li> <li>- Enfermedades de Transmisión Sexual</li> <li>- Tuberculosis</li> </ul>
Enfermedades neurológicas		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - sufre de demencia  - tiene historia de enfermedad del Sistema Nervioso Central de posible origen infeccioso (esclerosis múltiple, Enfermedad de Creutzfeldt Jakob)  - sufre de alteraciones neurodegenerativas de origen desconocido  - ha tenido un accidente vascular cerebral, crisis isquémica transitoria, embolia cerebral</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epilepsia</li> <li>- Neurocirugía</li> <li>- Enfermedades asociadas a priones</li> </ul>
Enfermedades renales	Nefritis aguda Nefritis crónica		
Enfisema		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Epilepsia		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- está en tratamiento por epilepsia</li> <li>- ha tenido una crisis en los últimos 3 años</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p>si la persona tiene una historia pasada de epilepsia que no ha tenido crisis ni ha requerido tratamiento en los últimos 3 años</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Un desmayo después de una donación puede llevar a convulsiones debido a la falta de oxígeno cerebral. En una persona con historia de epilepsia reciente esto puede terminar en una crisis epiléptica verdadera.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se trata de un problema recurrente o severo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurocirugía</li> <li>- Cáncer</li> </ul>
Epistaxis	Acné		
Eritromicina	Infección general		
Esclerosis múltiple		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Esferocitosis hereditaria		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene un shunt persistente</li> <li>- usa un catéter</li> <li>- tiene irritación o ulceración</li> </ul>	- Discapacidad
Espina bífida			
Espinillas	Acné Infección general		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Esplenectomía		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fue realizada por un cáncer</li> <li>- por un desorden mieloproliferativo</li> <li>- por trombocitopenia inmune</li> <li>- por anemia hemolítica</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si fue por traumatismo, una vez recuperado</li> <li>- si está tomando antibióticos profilácticos</li> </ul> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hay compromiso del sistema cardiovascular</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es leve y sólo afecta sistema locomotor</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La espondilitis anquilosante puede afectar las válvulas cardíacas y la aorta. La extracción de sangre puede poner al donante en riesgo de tener un problema cardíaco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trombocitopenia inmune</li> <li>- Cáncer</li> <li>- Cirugía</li> </ul>
Espondilitis anquilosante		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hay compromiso del sistema cardiovascular</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es leve y sólo afecta sistema locomotor</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La espondilitis anquilosante puede afectar las válvulas cardíacas y la aorta. La extracción de sangre puede poner al donante en riesgo de tener un problema cardíaco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discapacidad</li> <li>- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</li> </ul>
Esquizofrenia	Enfermedades mentales		
Esterilización	Cirugía		
Etretnato (Tigason)	Acné Psoriasis	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alguna vez ha recibido este medicamento</li> </ul>	
Exámenes		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- está en espera de exámenes o de resultados para una condición no diagnosticada aún y que podría significar el rechazo de la donación</li> </ul>	
Extracción dental	Dental, tratamiento		

CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Factor V Leiden	Trombosis		
Factores de coagulación	Coagulación, trastornos		
Factores de riesgo	Seguridad de la sangre		
Faringitis	Infección general		
Fatiga crónica	Fatiga post viral, síndrome		
Fatiga post viral, síndrome		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - no está resuelto	
Fertilidad, tratamiento	Infertilidad		
Fibromialgia	Inflamación		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Fiebre		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - han transcurrido menos de 2 semanas desde un episodio de fiebre</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si la fiebre está relacionada con un resfrío común u otra infección del tracto respiratorio superior y el donante está recuperado o en recuperación</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  Un alza de temperatura puede ser signo de infección, la que podría transmitirse a través de una transfusión. Un plazo de 2 semanas desde que la temperatura vuelve a la normalidad reduce el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre del donante.  No hay evidencia de que los resfríos comunes y las infecciones del tracto respiratorio superior se puedan transmitir a través de la transfusión pero igual es necesario esperar hasta que la infección esté evidentemente mejor antes de permitir la donación.</p>	- Infección general
Fiebre amarilla	Infección aguda		
Fiebre amarilla, vacunación	Vacunas		
Fiebre de Crimea		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	
Fiebre de Ebola		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	
Fiebre de Lassa		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Fiebre de Marburg		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	
Fiebre del Congo		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	
Fiebre del heno	Alergia		
Fiebre del heno, desensibilización		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 72 horas después de las inyecciones	
Fiebre Q		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Fiebre reumática	Enfermedad reumática		
Fierro, terapia	Anemia		
Filariasis	Infección crónica		
Finasteride (Proscar)		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 4 semanas de concluido el tratamiento	
Flebitis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha presentado más de 1 episodio en 12 meses - han transcurrido menos de 7 días del término del tratamiento <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se ha recuperado	- Anticoagulantes - Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Forúnculo	Infección aguda		
Fractura	Accidente		
Frecuencia de donación		<p><b>A CRITERIO :</b></p> <p><b>-Sangre total</b> Se debe observar un Intervalo mínimo de 12 semanas entre donaciones. Es aconsejable que las mujeres donen con intervalos de 16 semanas o más. En caso contrario estarán en riesgo mayor de padecer deficiencia de fierro.</p> <p><b>- Doble bolsa GR</b> Intervalo de 26 semanas entre donaciones</p> <p><b>- Plaquetas y plasma</b> Puede donar cada 72 horas y no más de 24 veces por año.</p> <p><b>- Leucocitos</b> No más de 12 veces al año</p> <p>Debería haber un mínimo de 48 horas entre procedimientos Y un donante no debería someterse a más de 2 procedimientos durante un período de 7 días</p>	
Garganta irritada	Infección general		
Gastrectomía		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - se ha realizado gastrectomía total</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - el donante está sintomático</p>	<p>- Cáncer</p> <p>- Cirugía</p>
Gastritis		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - si los síntomas se alivian con uso regular o esporádico de medicamentos y el donante está en buena salud</p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Gastroenteritis	Diarrea		
Giardiasis		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> es una infección intestinal local que no afecta la donación</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>- presenta ictericia evidente</p>	
Gilbert, enfermedad o síndrome		<p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> la enfermedad de Gilbert es un defecto congénito del metabolismo de la bilirrubina. Es inofensiva pero puede provocar ictericia. A los bancos de sangre no les gusta utilizar sangre que aparece ictericia, por lo que es probable que esos productos sean eliminados.</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si el tratamiento se ha completado o si sólo recibe gotas para los ojos</p>	- Cirugía
Glaucoma			- Cirugía
Gonorrea	Enfermedades de transmisión sexual		
Gota		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p>- Incluso si está en tratamiento</p> <p><b>OBLIGATORIO: determinar para qué se están usando y examinar el casillero apropiado.</b></p>	<p>- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</p> <p>- Enfermedades autoinmunes</p> <p>- Glaucoma</p> <p>- Infección general</p> <p>- Corticoides</p>
Gotas oculares		<p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> las gotas para los ojos se utilizan para una gran variedad de enfermedades, algunas de ellas impiden la donación, por lo que es muy importante saber la razón de su indicación.</p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Gran Mal	Epilepsia		
Granuloma inguinal	Infección crónica		
Graves, enfermedad	Tiroides, enfermedades		
Gripe	Infección aguda		
Guillain Barré		<p><b>OBLIGATORIO :</b>  <b>Derivar al Médico Responsable de Donantes</b></p> <p><b>No debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han pasado menos de 24 meses desde la recuperación</li> <li>- ha habido recurrencia de síntomas</li> <li>- el médico tratante no puede certificar que se trató de un Guillain Barré monofásico clásico</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> la causa del Síndrome de Guillain Barré no se conoce, pero con frecuencia se presenta tras un cuadro infeccioso o una vacuna. Probablemente se relaciona con autoanticuerpos contra partes del sistema nervioso periférico. Esta Guía considera evitar transferir a un receptor anticuerpos que pueden afectar su sistema nervioso</p>	- Transfusión si recibió plasma o inmunoglobulinas
Haemophilus influenzae, vacunación	Vacunas		
Hashimoto, enfermedad	Tiroides, enfermedad		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hematológica, enfermedad		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta enfermedad maligna, incluyendo desórdenes clonales como la policitemia vera y la trombocitosis esencial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anemia</li> <li>- Hemoglobina, desórdenes</li> <li>- Trombocitopenia</li> <li>- Sangría terapéutica</li> </ul>
Hematocrito, determinación		<p><b>OBLIGATORIO:</b> se debe medir el hematocrito o la concentración de hemoglobina cada vez que un donante potencial se presenta a donar. Las muestras de punción digital se utilizan para estimación con sulfato de cobre, otro sistema de medición de hemoglobina o para medición de microhematocrito .</p> <p><b>Todos los donantes, excepto los que donan 2 GR no deben donar si el Hematocrito es menor de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mujeres: Hto menor de 38%</li> <li>- Hombres : Hto menor de 40%</li> </ul> <p>Para donación de 2 GR, no aceptar si hematocrito es menor de 42% en ambos.</p>	
Hematuria		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- es producida por un cuadro infeccioso</li> <li>- es producida por una neoplasia</li> </ul> <p><b>OBLIGATORIO : referir a Médico Responsable de Donantes</b> si se ha indicado o planificado una sangría terapéutica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renales, enfermedades</li> </ul>
Hemocromatosis		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la donación no constituye un tratamiento o procedimiento terapéutico</li> </ul>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hemofilia	Coagulación, trastornos		
Hemoglobina, alteraciones		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufre de talasemia o drepanocitosis</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- donantes con rasgo para hemoglobina anormal</li> <li>- si el donante tiene rasgo talasémico, se le debe advertir que puede ser rechazado por hemoglobina baja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anemia</li> <li>- Drepanocitosis, rasgo</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hemoglobina, determinación	Volumen sanguíneo, estimación	<p><b>OBLIGATORIO:</b> la concentración de hemoglobina o el hematocrito deben medirse cada vez que un donante potencial se presenta a donar.  Las muestras de punción digital se utilizan para estimación con sulfato de cobre, otro sistema de medición de hemoglobina o para medición de microhematocrito.</p> <p><b>Todos los donantes, excepto los que donan 2 GR no deben donar si la concentración de hemoglobina es menor de :</b>  - Mujeres : bajo 12,5 g/dL  - Hombres : bajo 13,5 g/dL</p> <p>Para <b>donación de 2 GR</b>, no aceptar si hemoglobina es menor de 14.0 g/dL en ambos.</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si luego de una determinación por sulfato de cobre bajo los niveles aceptables, se realiza una determinación en sangre venosa con otra técnica y alcanza los niveles esperados</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> una donación de sangre total de 500 mL contiene aproximadamente 250 mg de fierro. Un donante promedio puede necesitar meses para reemplazar esta pérdida a partir de la dieta. Extraer sangre a una persona con niveles bajos de hemoglobina lo puede llevar a la anemia. Los donantes que donan 2 unidades de GR pierden el doble, por lo que deben tener niveles más altos</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - se trata de un problema recurrente o severo</p>	
Hemorragia nasal			



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hemorroides		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - presenta sangramiento severo o recurrente  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si está asintomático	- Cirugía
Henna, tintura		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Piercing
Hepatitis		<b>OBLIGATORIO :</b> <b>NOTA:</b> la hepatitis tiene variadas causas incluyendo infecciones e hipersensibilidad a drogas. Nuestra preocupación la constituyen las hepatitis virales  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se trata de una hepatitis <b>no viral</b> y se encuentra totalmente recuperado	- Hepatitis A - Hepatitis B - Hepatitis C - Hepatitis E - Hepatitis de origen desconocido
Hepatitis A - Infección		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde su recuperación	
Hepatitis A - Pareja sexual de caso confirmado		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde la recuperación de su pareja  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se demuestra que es inmune	
Hepatitis A -- Persona viviendo bajo el mismo techo		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han pasado menos de 12 meses desde la recuperación del último afectado en la casa  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se demuestra que es inmune	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hepatitis A - vacunación		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha estado expuesto a hepatitis y han pasado menos de 6 semanas desde la vacunación o la administración de inmunoglobulina intramuscular  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no ha estado expuesto a la enfermedad  <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> - la vacuna puede estar asociada con vacuna de hepatitis B	- Hepatitis B – post vacunación  - Viajes
Hepatitis B – Infección y portador conocido		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>  <b>A CRITERIO :</b> si han transcurrido más de 12 meses desde la recuperación, obtener antecedentes y muestras y referir al Médico Responsable de Donantes.  <b>INFORMACION ADICIONAL:</b> aceptar sólo si todos los marcadores son negativos o si Ac anti core positivo, antígeno de superficie negativo, y anticuerpo anti HBs en valores mayores de 100 UI/L documentados. No es necesario monitorear los niveles de de anti HBs. Cualquier exposición posterior al virus de la Hepatitis B actuará como booster de los niveles de anti HBs proporcionando protección contra el virus de la hepatitis B.	- Seguridad de la sangre
Hepatitis B – Historia de infección		<b>Si no es posible realizar estos exámenes no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Hepatitis B – Pareja sexual actual de portador confirmado</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO :</b> obtener los antecedentes y muestras y referir al Médico Responsable de Donantes</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>- aceptar sólo si Ac anti core positivo, antígeno de superficie negativo, y anticuerpo anti HBs en valores mayores de 100 UI/L documentados. No es necesario monitorear los niveles de de anti HBs. Cualquier exposición posterior al virus de la Hepatitis B actuará como booster de los niveles de anti HBs proporcionando protección contra el virus de la hepatitis B.</p> <p><b>Si no es posible realizar estos exámenes no debe donar</b></p>	<p>- Hepatitis B – post vacunación</p>
<p>Hepatitis B – Pareja sexual antigua de portador confirmado</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO :</b> si han transcurrido más de 12 meses desde el último contacto sexual obtener los antecedentes y muestras y referir al Médico Responsable de Donantes</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> aceptar sólo si todos los marcadores son negativos o Ac anti core positivo, antígeno de superficie negativo, y anticuerpo anti HBs en valores mayores de 100 UI/L documentados.</p> <p><b>Si no es posible realizar estos exámenes no debe donar</b></p>	<p>- Hepatitis B – post vacunación</p>




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Hepatitis B – Persona viviendo bajo el mismo techo</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO :</b> obtener antecedentes (si ya no comparte techo, informar desde cuando), obtener muestras y referir al Médico Responsable de Donantes</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si todavía sigue viviendo bajo el mismo techo:</li> <li>- aceptar sólo si tiene Ac anti core positivo, antígeno de superficie negativo, y anticuerpos anti HBs en valores mayores de 100 UI/L documentados. No es necesario monitorear los niveles de anti HBs. Cualquier exposición posterior al virus de la Hepatitis B actuará como booster de los niveles de anti HBs proporcionando protección contra el virus de la hepatitis B.</li> <li>- si no vive bajo el mismo techo desde hace más de 12 meses :</li> <li>- aceptar sólo si todos los marcadores son negativos o Ac anti core positivo, antígeno de superficie negativo, y anticuerpo anti HBs en valores mayores de 100 UI/L documentados.</li> </ul> <p><b>Si no es posible realizar estos exámenes no debe donar</b></p>	<p>- Hepatitis B – post vacunación</p>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Hepatitis B -- vacunación</p>		<p><b>DECISION A TOMAR</b></p> <p><b><u>EXPOSICION CONOCIDA A LA ENFERMEDAD</u></b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>A CRITERIO :</b>  - si han pasado más de 12 meses de la vacunación, obtener antecedentes y muestras y referir al Médico Responsable de Donantes</p> <p><b><u>EXPOSICION NO CONOCIDA</u></b>  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si :</b>  - han pasado menos de 7 días desde la última dosis</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si no hay exposición conocida y recibió inmunoglobulina intramuscular</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  Algunas técnicas de laboratorio muy sensibles pueden dar resultados positivos tras una vacunación reciente.</p>	
<p>Hepatitis C – Infección actual o pasada</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	<p>- Seguridad de la sangre</p>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Hepatitis C - Pareja sexual actual de individuo VHC positivo</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>  - Si han transcurrido menos de 12 meses desde el último contacto sexual</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si el donante informa que su pareja VHC positiva ha sido tratada exitosamente, no recibe tratamiento hace 12 meses y continúa en remisión</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL</b> : no se requiere confirmación del éxito de la terapia</p>	<p>- Seguridad de la sangre</p>
<p>Hepatitis C - Pareja sexual antigua de individuo VHC positivo</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - han transcurrido menos de 12 meses desde el último contacto sexual</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  <b>Si han pasado más de 12 meses de último contacto sexual.</b>  - si han pasado menos de 12 meses desde el último contacto sexual, y el donante informa que su pareja VHC positiva ha sido tratada exitosamente, no recibe tratamiento hace 12 meses y continúa en remisión</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL</b> : no se requiere confirmación del éxito de la terapia</p>	<p>- Seguridad de la sangre</p>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hepatitis C – Persona viviendo bajo el mismo techo		<p><b>A CRITERIO :</b> aceptar</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL:</b> la hepatitis C no es contagiosa ni se disemina a través de la vía fecal-oral. Generalmente su diseminación se produce a través de una vía sangre-sangre. Por esta razón no es necesario rechazar las personas bajo el mismo techo.</p>	<p>- Hepatitis C - Pareja sexual actual de individuo VHC positivo</p> <p>- Hepatitis C - Pareja sexual antigua de individuo VHC positivo</p>
Hepatitis E - Infeción		<p><b>OBLIGATORIO :</b> no debe donar si</p> <p>- han pasado menos de 12 meses desde su recuperación</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>- la hepatitis E es similar a la hepatitis A en su vía de diseminación (fecal-oral y contaminación de alimentos o agua con aguas servidas). Puede afectar a animales como los cerdos. Se ha informado transmisión por vía transfusional.</p>	<p>- Hepatitis A –post vacunación</p> <p>- Viajes</p>
Hepatitis E – Pareja sexual de caso confirmado		<p><b>OBLIGATORIO :</b> no debe donar si</p> <p>- han pasado menos de 12 meses desde la recuperación de su pareja</p>	
Hepatitis E – Persona viviendo bajo el mismo techo		<p><b>OBLIGATORIO :</b> no debe donar si</p> <p>- han pasado menos de 12 meses desde la recuperación del último afectado en la casa</p>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Hepatitis origen desconocido – individuo afectado</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 24 meses desde la recuperación</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - si han pasado menos de 24 meses y más de 12 meses desde la recuperación, obtener historia clínica, sacar muestras y derivar a Médico Responsable de Donantes.</p> <p>Si han pasado más de 24 meses de la recuperación, aceptar.</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> - si han pasado más de 12 meses y menos de 24 desde la recuperación y los marcadores de hepatitis B están todos negativos, aceptar - si el anticuerpo anti core de Hepatitis B está positivo y el antígeno de superficie está negativo y el anticuerpo anti s es de 100 UI/L en algún momento, aceptar</p> <p><b>Si no es posible realizar los exámenes no debe donar antes de los 24 meses</b></p>	
<p>Hepatitis de origen desconocido – Pareja sexual de individuo afectado</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 12 meses desde la recuperación de la pareja</p>	
<p>Hepatitis de origen desconocido – Persona viviendo bajo el mismo techo</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 12 meses desde la recuperación del último afectado en la casa</p>	<p>- Pareja sexual de individuo afectado, más arriba</p>



*[Handwritten signature]*

CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hereditarias, enfermedades		<b>OBLIGATORIO</b> <b>Chequear</b> si existe un casillero específico para la enfermedad. Si no lo hay, derivar al Médico Responsable de Donantes	
Herida por inoculación, cortopunzante		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - el elemento con el que se hirió contenía priones anormales - han transcurrido menos de 12 meses de un accidente cortopunzante o contaminación de mucosas o piel no intacta con sangre o fluidos corporales	
Heridas	Accidente		- Cirugía
Hernia del hiato		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - el donante está sintomático o los síntomas no alivian con el tratamiento  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si los síntomas se alivian con el uso regular o esporádico de medicamentos	
Hernia, cirugía	Cirugía	<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - las lesiones están frescas	- Enfermedades de transmisión sexual
Herpes genital		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si las lesiones están en curación siempre que no haya historia de otra Enfermedad de Transmisión Sexual  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - las lesiones son frescas	
Herpes oral, labial		<b>A CRITERIO : aceptar</b> si están en curación, en etapa de costra	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Herpes simplex			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herpes genital</li> <li>- Herpes oral</li> </ul>
Herpes Zoster			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infección Aguda</li> <li>- Enfermedades Infecciosas, contacto</li> </ul>
Hidatidosis	Infección crónica		
Hidrocefalia		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene una derivación endocraneal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurocirugía</li> <li>- Espina bífida</li> </ul>
Hipercolesterolemia		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta enfermedad sintomática</li> <li>- está asociado con enfermedad cardiovascular</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si no ha presentado enfermedad sintomática, aun cuando esté con medicamentos</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Hipercolesterolemia significa que los niveles de colesterol en la sangre están fuera de los rangos de referencia para la edad y sexo del donante. Generalmente esto se controla con dieta y con frecuencia con el uso de drogas. Niveles altos de colesterol no constituyen por si mismos una razón para rechazar un donante.</p> <p>Si la hipercolesterolemia ha provocado una enfermedad sintomática, como problemas cardiovasculares o trastornos visuales o neurológicos transitorios, el donante <b>no debe ser aceptado</b>, aunque los niveles de colesterol hayan vuelto a la normalidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedad Cardiovascular</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hipertensión arterial		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>a) la causa de la hipertensión está en investigación  b) ha cambiado los medicamentos en las últimas 4 semanas  c) ha presentado mareos, desmayos o se siente débil  d) ha tenido problemas cardíacos  e) presenta insuficiencia renal en estudio o tratamiento  f) ha requerido cirugía por obstrucción arterial, incluyendo amputación  g) tiene o ha tenido gangrena</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p>a) si está siendo evaluado por presión arterial alta, pero aún no comienza el tratamiento  b) si está siendo bien tratado por presión arterial alta, no se ha modificado ni el tipo ni la dosis de los medicamentos en las últimas 4 semanas y cifras de control están en rangos aceptables ( sistólica menor de 180 mmHg y diastólica menor de 100 mmHg)</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  La hipertensión arterial es una condición frecuente y la mayoría de las personas que la padece está en buen estado de salud y son aptas para la donación.  Sin embargo es de la mayor importancia evaluar cuidadosamente las complicaciones debidas a la hipertensión arterial y que se impida la donación cuando sea necesario (p.e. personas con daño cardiovascular, renal o con sintomatología debido a los medicamentos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades cardiovascular</li> <li>- Enfermedades neurológicas</li> <li>- Claudicación intermitente</li> </ul>
Hipertiroidismo	Tiroides, enfermedades		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hipnóticos		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p><b>A CRITERIO : aceptar si donante no es propenso a desmayos o mareos</b></p>	
Hipotensión arterial		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La presión arterial baja no constituye normalmente un problema si el donante está en buena salud y no sufre de desmayos o mareos. La presión arterial baja es común en mujeres y parece estar relacionada con los niveles de estrógeno.</p> <p>La presión arterial baja también puede estar causada por una enfermedad cardíaca grave; en esos casos no se debe aceptar la donación.</p> <p>Un desmayo puede poner a un donante en riesgo de sufrir una lesión. Todo donante con antecedentes de desmayos o mareos no debe donar.</p>	
Hipotiroidismo	Tiroides, enfermedades		
Histerectomía	Cirugía		
Homeopatía	Terapias alternativas		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Hormonal, terapia de reemplazo		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - fue indicada por una enfermedad maligna - si ha recibido gonadotrofina hipofisaria u hormona de crecimiento de origen humano  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si el tratamiento es para los síntomas de la menopausia o prevención de osteoporosis - si ha recibido exclusivamente gonadotrofina no hipofisaria u hormona de crecimiento recombinante	- Enfermedades asociadas a priones  - Tiroides, enfermedades
Hormonas hipofisarias de origen humano		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha recibido alguna vez una inyección de hormona hipofisaria de origen humano	- Hormona de crecimiento - Enfermedades asociadas a priones
HTLV - Infección		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Seguridad de la sangre
HTLV - Pareja sexual actual de caso confirmado		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Seguridad de la sangre
HTLV - Pareja sexual antigua de caso confirmado		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 12 meses desde el último contacto sexual  <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es sintomático  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si es portador asintomático	- Seguridad de la sangre
Huntington, enfermedad de			
Ibuprofeno	Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Ictericia		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene ictericia</li> <li>- tiene historia de ictericia</li> <li>- si la causa de la ictericia fue viral, ver el casillero correspondiente</li> <li>- si la causa de la ictericia fue desconocida, tratar como Hepatitis de Origen Desconocido</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se ha recuperado totalmente de una causa no viral de ictericia (incluye, aunque no exclusivamente, la ictericia fisiológica del RN, cálculos biliares, reacciones a drogas, etc.)</li> <li>- si la ictericia se debe a Síndrome de Gilbert y no tiene ictericia visible</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las Unidades de Medicina Transfusional no utilizan sangre con apariencia icterica, por lo que una unidad visiblemente icterica probablemente será eliminada.</p> <p>La ictericia puede tener muchas causas. Las que preocupan son las causas infecciosas que pueden ser transmitidas por una transfusión.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fue realizada por un cáncer o por una enfermedad inflamatoria del intestino</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la razón de la ileostomía no es causal de rechazo y el ostoma está sano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vesícula, enfermedad</li> <li>- Gilbert, enfermedad o síndrome</li> <li>- Hepatitis A</li> <li>- Hepatitis B</li> <li>- Hepatitis C</li> <li>- Hepatitis E</li> </ul>
Ileostomía			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cirugía</li> </ul>
Implante de mama	Cirugía		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Indigestión	Gastritis Diarrea		
Infarto del miocardio	Trombosis coronaria		

SUBSECRETARÍA DE ASesoría JURÍDICA  
 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Infección aguda		<p><b>OBLIGATORIO</b>  <b>Chequear</b> si existe un casillero específico para la enfermedad que se está investigando</p> <p><b>No debe donar si :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- está infectado</li> <li>- han transcurrido menos de 2 semanas desde la recuperación</li> <li>- han transcurrido menos de 7 días de terminado el tratamiento antimicrobiano, antiviral o antimicótico</li> </ul> <p><b>Escoger el criterio más largo</b></p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- herpes labial, genital y enfermedades comunes del tracto respiratorio superior como resfrío o irritación faríngea, si están en recuperación</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Muchas infecciones pueden ser transmitidas a través de la transfusión sanguínea. Es muy importante que el donante no constituya un riesgo de transmisión de una infección al receptor. Un plazo de 2 semanas desde la mejoría de una infección y de 7 días de terminado un tratamiento antimicrobiano, antiviral o antimicótico hace muy improbable el riesgo de transmisión de una infección.</p> <p>No hay evidencias que los herpes labial, genital o enfermedades comunes del tracto respiratorio superior como resfrío o irritación faríngea, se transmitan por la transfusión, pero es necesario esperar que cualquiera de estas infecciones haya remitido o esté en recuperación manifiesta antes de permitir la donación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiebre del Congo</li> <li>- Fiebre de Ebola</li> <li>- Fiebre de Lassa</li> <li>- Fiebre de Marburg</li> <li>- Fiebre de Crimea</li> <li>- Herpes genital</li> <li>- Herpes oral</li> <li>- Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR)</li> <li>- Corticoides</li> <li>- Virus West Nile</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Infección crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - acné; la mayoría de los donantes con acné pueden ser aceptados. - infecciones micóticas superficiales, si no están recibiendo terapia sistémica en últimas 2 semanas	- Acné - Corticoides
Infección general		<b>OBLIGATORIO</b> <b>Chequear</b> si existe un casillero específico para la enfermedad	Decidir si es : - <b>infección aguda</b> (corta duración, sin estado de portador, Ej. Gripe)  - <b>infección crónica</b> (dura más que unas semanas y posiblemente puede haber portación crónica del microorganismo, Ej. malaria o tifoidea)
Infección micótica	Infección general		
Infección micótica de las uñas	Infección crónica		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Infección tropical	Infección general		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiebre del Congo</li> <li>- Fiebre de Ebola</li> <li>- Fiebre de Lassa</li> <li>- Fiebre de Marburg</li> <li>- Fiebre de Crimea</li> <li>- Malaria</li> <li>- Chagas, enfermedad</li> </ul>
Infección urinaria	Infección general	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- está en investigación</li> <li>- han transcurrido menos de 12 semanas de completado el tratamiento con Clomifeno o Tamoxifeno</li> <li>- ha recibido alguna vez gonadotrofina humana de origen hipofisiaria</li> </ul> <p><i>Tener cuidado de descartar embarazo</i></p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si fue tratada sólo con gonadotrofina no hipofisiaria</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> El periodo de 12 semanas es una seguridad adicional para no extraer sangre en un embarazo inicial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades asociadas a priones</li> </ul>
Inflamación	Infección general Antiinflamatorios no esteroidales (AINES)		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Influenza	Infección aguda		
Influenza, vacunación	Vacunas		
Inhalador	Asma Cirugía		
Injerto óseo	Receptor de órganos y tejidos	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha sido tratado con inmunoglobulina humana endovenosa o subcutánea desde el año 1980</li> <li>- es inmunodeprimido</li> </ul> <p><b>DERIVAR</b> los donantes que se han recuperado de una inmunodeficiencia al Médico Responsable de Donantes</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la inmunoglobulina humana endovenosa o subcutánea se administró antes del año 1980</li> <li>- uso rutinario de inmunoglobulina anti D perinatal</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Es improbable que la inmunoglobulina utilizada antes de 1980 pueda transmitir variante de Enfermedad de Creutzfeldt Jacob</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hepatitis A</li> <li>- Hepatitis B</li> <li>- Rabia – vacunación</li> <li>- Tétano - vacunación</li> </ul>
Inmunoglobulina, terapia			



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Inmunosupresión		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es inmunodeprimido  <b>DERIVAR</b> los donantes que se han recuperado de una inmunodeficiencia al Médico Responsable de Donantes	- Inmunoglobulina, terapia
Intoxicación alimentaria	Diarrea		
Isotretinoína (Acnotin, Isbiden, Piplex, Roacnetan, Roacutan)	Acné		
Isquemia cerebral transitoria		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Isquemia del corazón	Enfermedad cardiovascular		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Jaqueca		<p><b>DECISION A TOMAR</b></p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- los dolores son frecuentes, severos y requieren tratamiento regular</li> <li>- está utilizando Clonidina como profilaxis</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si está utilizando Beta bloqueadores o pizotifen como profilaxis</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La jaqueca o migraña es causada por alteraciones en el flujo sanguíneo hacia algunas partes del cerebro. En sus formas más severas puede ser muy discapacitante. Al no permitir la donación de personas con formas severas de jaqueca se pretende prevenir la aparición de una crisis precipitada por la donación. Si un donante ha presentado una jaqueca asociada a la donación en más de una ocasión, se le debe advertir que no vuelva a donar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cefalea</li> </ul>
Kala azar	Infección crónica		
Klinefelter, síndrome		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Lactancia	Embarazo		
Laminectomía	Cirugía		
Laringitis	Infección general		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Laser, tratamiento		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - fue realizado por cáncer  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si fue por Carcinoma Basocelular y el tratamiento se ha completado - si fue por Cáncer Cérvicouterino in Situ y el tratamiento se ha completado - si fue con propósitos cosméticos y ya ha sanado	- Carcinoma Basocelular - Cáncer Cérvicouterino in Situ
Legionario, enfermedad del	Infección aguda		
Leishmaniasis	Infección crónica		
Leptospirosis	Infección aguda		
Lesbianismo		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Leucemia	Cáncer		
Linfogranuloma venéreo	Infección crónica		
Listeriosis	Infección aguda		
Litio, tratamiento	Enfermedades mentales		
Lupus eritematoso		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Lyme, enfermedad	Infección aguda		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Malaria		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alguna vez ha tenido malaria</li> <li>- ha tenido una fiebre de origen desconocido en el extranjero o después de 6 meses de abandonar una zona endémica de malaria</li> <li>- han transcurrido menos de 12 meses después de abandonar una zona endémica de malaria</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p><b>Donantes que han sido diagnosticados con malaria :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si han pasado más de 3 años de completar terapia antimalárica, está asintomático, y los anticuerpos antimalaria son negativos</li> </ul> <p><b>Otros donantes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si han pasado al menos 6 meses desde la última exposición a malaria o de la recuperación de síntomas que podrían haber correspondido a malaria y los anticuerpos antimalaria son negativos.</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Se han producido casos de malaria transmitidos por transfusión muchos años después de la última vez que el donante estuvo en riesgo de adquirir la malaria. Este es un problema principalmente en personas que han tenido episodios repetidos. Esto es poco común, pero antes de autorizar la donación de una persona que tuvo o pudo haber tenido malaria es más seguro hacer test de anticuerpos antimalaria más que esperar un periodo determinado de tiempo. La malaria transfusional es a menudo fatal.</p> <p><b>IMPORTANTE : Si no se cuenta con la determinación de anticuerpos anti malaria no se debe aceptar la donación</b></p>	<p>- Riesgo de Enfermedades según Ubicación Geográfica</p>




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Maníaco-depresivo	Enfermedades mentales		
Mantoux, test		<b>OBLIGATORIO : no debe donar a menos que</b> - el resultado haya sido negativo y no se haya requerido más investigaciones	- Tuberculosis
Marfan, síndrome		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - hay compromiso cardiovascular <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no lo hay	
Marihuana	Adicción y abuso de drogas		
Mastectomía	Cirugía		
Mastoiditis	Infección general		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Medicamentos		<p><b>OBLIGATORIO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El uso de algunos medicamentos puede hacer diferir el donante debido a la enfermedad subyacente o a la droga propiamente tal.</li> </ul> <p><b>Chequear</b> si hay un casillero especial para la enfermedad o para el medicamento</p> <p><b>A CRITERIO :</b></p> <p>La automedicación con algunos medicamentos como vitaminas, aspirinas, pastillas para dormir no debe significar el rechazo del donante si es que cumple con todos los otros criterios de aceptación</p>	<p>- Antinflamatorios no esteroideos (AINES)</p>
Medicamentos tópicos		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el sitio de punción está afectado</li> <li>- hay piel infectada o dañada</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la razón del tratamiento no es causa de exclusión</li> </ul>	
Melanoma maligno	Cáncer	<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p>	
Meniere, enfermedad		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p>	
Meningitis	Infección aguda	<p><b>CONTACTO :</b></p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incluso con antibióticos profilácticos</li> </ul>	
Meningitis vacunación	Vacunas		
Menopausia		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p>	<p>- Hormonal, terapia de reemplazo</p>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Menstruación		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - presenta atraso  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se puede descartar el embarazo y la donante está en buenas condiciones	- Embarazo
Miastenia gravis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Miocarditis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 12 meses desde la recuperación	
Mioma, cirugía	Cirugía		
Mixedema	Tiroides, enfermedades		
Mola	Embarazo		
Mononucleosis	Infección aguda		
Montañismo	Actividades peligrosas		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Mordedura animal		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la herida está infectada o no curada</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las mordeduras de animal pueden provocar distintas infecciones por lo que se debe esperar que las heridas estén sanas. La rabia y otras enfermedades similares tienen períodos de incubación prolongados y no se evidencian como infección de una herida. No hay evidencia que estas infecciones hayan sido transmitidas a través de una transfusión sanguínea. Estas enfermedades durante su período de incubación parecen confinadas al sistema nervioso y hay evidencias que han sido transmitidas a través de trasplantes oculares y de órganos. Por esta razón hay reglas para el material que pueda contener tejido nervioso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infección general</li> <li>- Rabia, vacunación</li> </ul>
Mordedura humana	Herida por inoculación		
Narcolepsia		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Nefrectomía	Cirugía	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han transcurrido menos de 5 años de la recuperación</li> </ul>	
Nefritis aguda		<p><b>A CRITERIO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- las enfermedades renales autolimitadas como un episodio de glomerulonefritis aguda o pielitis con recuperación completa, no descalifican necesariamente al donante.</li> </ul> <p>Si hay dudas en el diagnóstico derivar al Médico Responsable de Donantes.</p>	
Nefritis crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Neotigason	Acné Psoriasis		
Neumococo, vacunación	Vacunas		
Neumonía	Infección aguda		
Neumotórax espontáneo		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - no ha recibido el alta médica - está asociado con enfisema	
Neumotórax traumático	Accidente	<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Neurocirugía		<b>A CRITERIO : aceptar si la causa de la cirugía no es causal de rechazo y</b> - si sólo se trató de trepanación - si se puede demostrar que no se utilizó duramadre en la cirugía y no hay evidencias de malignidad, el donante podrá ser aceptado por el Médico Responsable de Donantes	- Enfermedades por priones - Cirugía
Neurofibromatosis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - hay historia de malignización <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no la hay	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Nódulo mamario	Cirugía	<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es maligno - no está suficientemente investigado y no se ha descartado que sea maligno	
Obesidad	Peso		
Orzuelo	Infección aguda		
Osteoartritis		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	- Discapacidad - Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
Osteomalacia		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 2 años desde el tratamiento y la curación	Discapacida
Osteomielitis		<b>INFORMACION ADICIONAL :</b> A veces es difícil estar seguros de la eliminación completa de la infección. Esperar 2 años minimiza el riesgo de transmitir infecciones a través de la transfusión sanguínea	
Osteoporosis		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si está en tratamiento preventivo o curativo	- Discapacidad - Corticoides
Oxiuriasis		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - incluso si está en tratamiento	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Paget, enfermedad ósea (incluye osteítis deformans)		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - si está con medicamentos analgésicos o bifosfonatos</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Esta enfermedad es muy común; afecta a adultos mayores de 50 años. No se conoce la causa. Muchas personas asintomáticas serán aceptadas como donantes. No hay evidencia que se disemine a través de la donación. Con frecuencia es tratada con analgésicos y bifosfonatos. El uso de estas drogas se acepta en otras condiciones por lo que no hay razón para que los donantes con Enfermedad de Paget no sean aceptados al usarlas, siempre que cumplan los demás requisitos de la donación.</p>	<p>- Discapacidad - Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)</p>
Palpitaciones	Arritmias		
PAP alterado	Cáncer cervicouterino, in situ		
Paracaidismo	Actividades peligrosas		
Paracetamol	Analgésicos		
Paranoia	Enfermedades mentales		
Paratifoidea		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Parkinson, enfermedad de	Enfermedades neurológicas		
Parotiditis	Infección aguda		
Parotiditis, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Parotiditis, vacunación	Vacunas		
Pastillas para dormir	Hipnóticos		
Pedicure		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - hay heridas abiertas o infección	- Infección general , (micosis)
Pérdida de conciencia	Accidente		
Pericarditis viral	Infección aguda		
Peritonitis	Infección general Cirugía		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Personas privadas de libertad</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>            -Han estado en una institución correccional (cárcel o prisión) por más de 72 horas, durante los últimos 12 meses.</p> <p>No deben hacerse colectas de sangre en las prisiones.</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>            No será posible aceptar donaciones de personas que han estado en una institución correccional (cárcel o prisión) por más de 72 horas o quienes han tenido historial de encarcelamiento en los últimos 12 meses, atendida la existencia de una alta prevalencia enfermedades infecciosas y condiciones de salubridad deficitarias; lo que implica una alta posibilidad de mayor de transmisión de enfermedades.</p>	
<p><b>Perthes, enfermedad</b></p>		<p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p><b>Peso</b></p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pesa menos de 50 kilos (<i>donante de sangre total</i>)</li> <li>- pesa menos de 70 kilos (<i>donante de componentes y donante de 2 unidades de Glóbulos Rojos</i>)</li> </ul> <p><b>Aquellos que refieren reducción de 10 kilos de peso últimos 6 meses, sin dieta que lo explique deben ser referidos a evaluación y rechazados temporalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el donante tiene un sobrepeso tal que tiene dificultad para subirse o bajarse de la camilla</li> <li>- el acceso venoso es muy difícil</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si está recibiendo medicamentos antiobesidad</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>El personal no debe arriesgar su salud ayudando a los donantes a bajar y subir de la camilla, salvo en emergencias. Se recomienda que los donantes no pierdan más del 13% de su volumen sanguíneo durante el proceso de donación. Esto es para protegerlos de reacciones adversas como desmayos y anemia. Hay un peso mínimo necesario para aceptar la donación, pero esto puede no ser siempre apropiado, especialmente en la donación de 2 glóbulos rojos. La obesidad también hace aconsejable usar otros parámetros además del peso. La grasa contiene proporcionalmente mucho menos sangre que el músculo. En individuos obesos el volumen sanguíneo puede ser sobrestimado si se basa sólo en el peso. Sobre estimar el volumen sanguíneo de un donante aumenta la posibilidad que tenga una reacción adversa.</p>	<p>- Volumen sanguíneo, estimación</p>

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Petit Mal	Epilepsia		
Pie de atleta	Infección general		
Piel, enfermedades		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el sitio de punción está afectado</li> <li>- la lesión está infectada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acné</li> <li>- Dermatitis</li> <li>- Psoriasis</li> </ul>
Pielonefritis	Infección general	<p><b>OBLIGATORIO: no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han pasado menos de 12 meses desde el último piercing.</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p>Si han transcurrido más de 12 meses del último tatuaje o piercing.</p>	
Piercing		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Se ha producido traspaso de infecciones de persona a persona a través de piercing. Un plazo de 12 meses permite que el laboratorio del Centro de Sangre pesquise una posible infección.</p> <p>Durante la fase de recuperación de una Hepatitis B, los niveles de antígeno de superficie pueden ser muy bajos para ser detectados. El anticuerpo para el antígeno core de hepatitis B puede ser el único indicador de infectividad.</p>	
Pildora día después	Anticonceptivos		
Pilotos	Actividades peligrosas		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Plaquetas, alteraciones		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene sangramiento o hematomas excesivos</li> </ul> <p><b>OBLIGATORIO :</b></p> <p><b>Donantes de plaquetas no deben donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el recuento predonación es menor de <math>150 \times 10^9/L</math></li> <li>- el recuento postdonación se proyecta menor de <math>100 \times 10^9/L</math></li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en ocasiones excepcionales y autorizado por el Médico Responsable de Donantes se puede permitir una donación de plaquetas si el recuento postdonación se proyecta menor de <math>100 \times 10^9/L</math> pero mayor de <math>80 \times 10^9/L</math></li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Si se extraen plaquetas a un donante con un recuento predonación menor de <math>150 \times 10^9/L</math> no se obtendrá un producto adecuado para terapia.</p> <p>Dejar un donante con un recuento menor de <math>80 \times 10^9/L</math> puede constituir un riesgo de sangramiento frente a un traumatismo.</p>	
Plaquetas, recuento		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiene sangramiento o hematomas excesivos</li> </ul> <p><b>OBLIGATORIO :</b></p> <p><b>Donantes de plaquetas no deben donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el recuento predonación es menor de <math>150 \times 10^9/L</math></li> <li>- el recuento postdonación se proyecta menor de <math>100 \times 10^9/L</math></li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en ocasiones excepcionales y autorizado por el Médico Responsable de Donantes se puede permitir una donación de plaquetas si el recuento postdonación se proyecta menor de <math>100 \times 10^9/L</math> pero mayor de <math>80 \times 10^9/L</math></li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Si se extraen plaquetas a un donante con un recuento predonación menor de <math>150 \times 10^9/L</math> no se obtendrá un producto adecuado para terapia.</p> <p>Dejar un donante con un recuento menor de <math>80 \times 10^9/L</math> puede constituir un riesgo de sangramiento frente a un traumatismo.</p>	
Plazo entre donaciones	Frecuencia de donaciones		
Pleuresía	Infección general Cáncer		
Policitemia		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Polimialgia reumática		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Polio, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Polio, vacunación	Vacunas		
Pólipos	Cirugía		
Pólipos nasales			- Alergia - Cirugía
Presión arterial alta	Hipertensión arterial		
Presión arterial baja	Hipotensión		
Proctitis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - se debe a colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn - requiere tratamiento <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se debe a otras causas y no está en tratamiento	- Enfermedad intestinal Inflammatoria
Prolapso válvula mitral	Enfermedad cardiovascular		
Propranolol	Beta bloqueadores		
Proscar	Finasteride		
Prostatectomía	Cirugía		
Prostitutas		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Seguridad de la sangre




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Protocolos de investigación		<p><b>OBLIGATORIO: no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el donante está participando en un ensayo clínico. Incluye uso de drogas, y se aplica a individuos sanos participando como voluntarios</li> </ul> <p><b>A CRITERIO :</b> aceptar si un Médico Designado examina el protocolo y lo acepta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapias alternativas</li> <li>- Transfusión</li> </ul>
Psiquiátricos, problemas	Enfermedades mentales	<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha recibido alguna vez Etreinato (Tigason)</li> <li>- han transcurrido menos de 12 meses desde la última dosis de Acitretin (Neotigason)</li> <li>- es generalizada o severa</li> <li>- está asociada a artropatía</li> <li>- hay infección secundaria</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si es leve, el sitio de venopunción no está afectado y sólo recibe tratamiento local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoinmune, enfermedad</li> </ul>
Psoriasis		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La psoriasis es una enfermedad de la piel causada por un proceso autoinmune. Alrededor de uno de cada diez pacientes desarrolla problemas articulares (artropatía psoriática). A veces la enfermedad es tratada con drogas para suprimir el proceso autoinmune. Esto puede afectar los mecanismos de defensa a la infección. En estos casos no se debe aceptar la donación.</p>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Púrpura Trombocitopénico Idiopático	Trombocitopenia inmune		
Quimioterapia	Cáncer		
Quiste ovárico		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es maligno	- Cirugía
Quistes, resección	Cirugía		
Rabia, vacunación		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> - si se administró luego de una mordedura animal hasta 12 meses después de la exposición <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no hubo mordedura	
Radioactivas, sustancias		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> <b>Terapia con yodo radioactivo :</b> - si es para cáncer - si han pasado menos de 6 meses de la administración <b>Otros tratamientos o exámenes :</b> - derivar a Médico Responsable de Donantes <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> En general, las sustancias usadas para diagnóstico se eliminan dentro de 24 horas. Algunos, como el yodo radioactivo tiene vida media larga y los donantes no deben aceptarse hasta que hayan transcurrido 6 meses.	- Cáncer - Tiroides, enfermedades



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Radioterapia		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es por cáncer, salvo que sea Carcinoma basocelular - todo otro tratamiento, derivar a Médico Responsable de Donantes	- Carcinoma basocelular - Cáncer
Raynaud, síndrome		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - es parte de una enfermedad sistémica - está en tratamiento con vasodilatadores <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si es una condición aislada y no toma vasodilatadores	
Receptor de órganos o tejidos	Cirugía Transfusión	<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> Ha recibido un trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos. (Rechazo permanente). Los receptores de otros tejidos alogénicos se diferencian por 12 meses. <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> El traspaso de órganos o tejidos entre individuos y entre especies ha tenido como consecuencia la diseminación de infecciones. Estas Guías pretenden minimizar ese riesgo.	- Inmunosupresión - Trasplante córnea - Enfermedades asociadas a priones - Xenotrasplante (trasplante interespecies)
Reflujo	Gastritis		
Renal, infección	Infección general		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Renal, trasplante	Cirugía Receptor de órganos y tejidos		
Resfrío	Infección aguda		
Respiratorias, enfermedades		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - está con disnea aunque sea mínima	- Infección general - Corticoides
Retinitis pigmentosa	Discapacidad	<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Rinitis aguda	Infección aguda		
Rinitis crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - está recibiendo medicamentos prescritos por un médico <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si sólo usa descongestionante nasal	- Infección general
Riñón, donante	Cirugía		
Riñón, receptor	Receptor de órganos y tejidos		
Roacutane	Acné		
Rosacea	Acné		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Rubéola	Infección aguda		
Rubéola, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Rubéola, vacunación	Vacunas		
Salpingitis	Infección general		- Hemocromatosis
Sangría terapéutica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Las sangrías terapéuticas no deben ser realizadas en el contexto de la atención de donantes	
Sarampión	Infección aguda		
Sarampión, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Sarampión, vacunación	Vacunas		
Sarcoidosis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han transcurrido menos de 21 días de regresar de un país en el cual hay posibilidades de transmisión de SARS</li> <li>- han transcurrido menos de 21 días del contacto con una persona con SARS</li> <li>- han transcurrido menos de 3 meses desde la recuperación de SARS o posible SARS</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si han transcurrido más de 21 días desde el retorno de un área endémica o del contacto con una persona enferma con SARS y el donante permanece bien</li> </ul>	
Sedantes	Ansiedad VIH, infección		
SIDA	Seguridad de la sangre		
Sífilis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Sífilis, contacto	Enfermedades de Transmisión Sexual		
Síncope	Desmayos		
Síndrome del túnel carpiano	Cirugía		
Sinusitis	Infección general		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Soplo cardiaco	Enfermedad cardiovascular		
Sordera	Discapacidad		
Spray nasal	Alergias		
Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR)		<b>INFORMACION ADICIONAL :</b> El Staphylococcus aureus es un microorganismo comensal frecuente de la piel. Tanto el estado de portador como la exposición no son relevantes para la donación de sangre. <b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - no tiene explicación	Infección general
Sudoración nocturna		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se debe a la menopausia	
Talasemia mayor	Hemoglobina, alteraciones		
Talasemia, rasgo	Hemoglobina, alteraciones		
Tamoxifeno		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - ha sido usado por cáncer - mientras esté en uso si es para otras condiciones no malignas	- Infertilidad
Tatuajes	Piercing		
TEC	Accidente		
Tendinitis	Inflamación		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Terapias alternativas		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - la condición por la que recibe la terapia es causal de rechazo - si involucra uso de agujas, diferir por 12 meses <b>A CRITERIO : aceptar</b> -si involucra uso de agujas y el acupunturista es médico validado	- Acupuntura
Tétanos, vacunación	Acné	<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 4 semanas de la exposición <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no hubo exposición	
Tetraciclina	Infección general		
Tifoidea	Infección crónica		
Tifoidea, vacunación	Vacunas		
Tigason	Etretnato		
Tiña		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - afecta sitio de punción - está con tratamiento sistémico <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si sólo está con tratamiento local	- Infección general



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Tiroides, enfermedades		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - está en estudio - tiene cáncer - es parte de un desorden multisistémico - han transcurrido menos de 6 meses desde el tratamiento con yodo radioactivo - han transcurrido menos de 24 meses del término del tratamiento con tabletas antitiroideas - recibe betabloqueadores para controlar los síntomas  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si está con tratamiento de mantención estable con tiroxina	- Cirugía
Tirotoxicosis	Tiroideas, enfermedades		
Tiroxina	Tiroideas, enfermedades		
Tos convulsiva	Infección aguda		
Tos convulsiva, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Toxoplasmosis aguda		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 6 meses desde la recuperación	
Toxoplasmosis crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Trabajador de la salud		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no ha tenido accidente cortopunzante en los últimos 12 meses	- Herida por inoculación
Tranquilizantes	Ansiedad		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Transfusión		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p><b>Hace menos de 12 meses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha recibido concentrados de factores de coagulación derivados de la sangre</li> <li>- ha recibido o cree haber recibido una transfusión de glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitados, inmunoglobulina humana EV o subcutánea. Esto incluye madres cuyos bebés recibieron transfusiones intrauterinas</li> <li>- ha sido sometido a un recambio plasmático.</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <p><b>Si ha transcurrido más de 12 meses desde la última transfusión de componentes sanguíneos.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- donante que recibió transfusión autóloga</li> </ul> <p><b>Si tras el interrogatorio es improbable que haya recibido transfusión, aceptar.</b></p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Los donantes transfundidos han contribuido a la diseminación de algunas enfermedades, como ocurrió con la Hepatitis C, y podría ocurrir con otros agentes en el futuro. Como principio de precaución, al evitar transfundir sangre o componentes de una persona previamente transfundida se pretende evitar que vuelva a ocurrir un caso semejante.</p> <p>Las personas que han recibido concentrados de factores de coagulación (que se preparan a partir de sangre de muchos donantes) pueden haber estado en riesgo de adquirir infecciones que se transmiten por la sangre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coagulación, trastornos</li> <li>- Inmunoglobulina, terapia</li> <li>- Inmunosupresión</li> <li>- Malaria</li> <li>- Chagas, enfermedad</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Transplante	Receptor de órganos o tejidos		- Enfermedades asociadas a priones
Transplante córnea		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Traqueitis	Infección general		
Trastorno obsesivo compulsivo	Enfermedades mentales		
Trauma	Accidente		
<b>Trombocitopenia inmune</b>		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> - si está sintomático - es crónica - se ha recuperado pero ha tenido una recaída - se ha recuperado, pero han pasado menos de 5 años  Esto aplica tanto a adultos como a niños.	<b>Si ha recibido inmunoglobulinas o recambio plasmático, ver - Transfusión</b>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Trombosis		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se debe a arterioesclerosis (p.e. trombosis coronaria)</li> <li>- historia de trombosis de la vena axilar</li> <li>- trombosis recurrentes</li> <li>- han transcurrido menos de 7 días de terminado el tratamiento anticoagulante</li> <li>- tiene un rasgo trombofílico y ha tenido uno o más episodios de trombosis</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si se ha identificado una causa específica de una trombosis venosa profunda aislada o de tromboembolismo pulmonar, y esta causa por si misma no es causal de rechazo y han transcurrido más de 7 días de terminado el tratamiento anticoagulante</li> <li>- tiene un rasgo trombofílico y no ha tenido nunca un episodio de trombosis</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> La trombosis venosa profunda sin causa que la explique se asocia con un alto riesgo de arterioesclerosis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anticoagulantes</li> <li>- Cáncer</li> </ul>
Trombosis coronaria		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Trombosis venosa profunda	Trombosis		
Tropicales, enfermedades			- Infección tropical
Trypanosomiasis	Chagas, enfermedad		
Trypanosomiasis africana	Infección crónica		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Tuberculina, test		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b> - hasta la curación de la lesión</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - está infectado - han transcurrido menos 3 años de la confirmación de la curación - está en estudio</p>	- BCG
Tuberculosis		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar hasta</b> - que se haya estudiado y descartado</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> - si el donante ha sido informado que no necesita ser estudiado</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b> La tuberculosis puede estar presente en muchos tejidos y diseminarse por el torrente sanguíneo. Es razonable excluir como donante a personas que pueden tener la enfermedad activa para prevenir toda posibilidad de transmisión de la infección.</p>	
Tumor cerebral	Neurocirugía		
Tumores	Cáncer		
Turner, síndrome		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	
Úlcera duodenal	Úlcera péptica		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Úlcera péptica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - los síntomas son recientes o está en tratamiento activo - se sometió a una gastrectomía total - está asociada a malignización  <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no tiene síntomas, aún con tratamiento de mantención	- Cirugía
Uña, infección	Infección crónica		
Uretritis aguda	Infección aguda		
Uretritis crónica		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	
Urticaria	Alergia		




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Vacunas		<p><b>OBLIGATORIO : no de debe donar si</b> han transcurrido menos de 8 semanas de la vacunación con <b>microorganismos vivos</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fiebre amarilla</li> <li>- parotiditis</li> <li>- polio <u>oral</u></li> <li>- rubéola</li> <li>- sarampión</li> <li>- tifoidea <u>oral</u></li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b> si la vacunación se realiza con <b>microorganismos no vivos</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ántrax</li> <li>- botulismo</li> <li>- cólera</li> <li>- difteria</li> <li>- haemophilus influenzae</li> <li>- influenza</li> <li>- meningococo</li> <li>- neumococo</li> <li>- polio <u>inyectable</u></li> <li>- tifoidea <u>inyectable</u></li> <li>- coqueluche</li> </ul> <p><b>CASOS ESPECIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>RABIA</b> : dirigirse a Rabia, vacunación</li> <li>❖ <b>TÉTANOS</b> : dirigirse a Tétanos, vacunación</li> </ul>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Vacunas (CONT.)		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Las vacunas que utilizan virus o bacterias vivos atenuados estimulan el sistema inmune, pero normalmente no causan una enfermedad severa. Sin embargo pueden hacerlo en personas inmunodeprimidas. Al diferir por 8 semanas la donación, se evita la transmisión a través de la sangre o tejidos de una enfermedad causada por la vacuna, pues esta ya estaría controlada.</p>	
Varicela, contacto	Enfermedades infecciosas, contacto		
Varicela zoster, herpes zoster	Infección aguda		
Várices		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flebitis</li> <li>- Cirugía</li> <li>- Trombosis</li> </ul>
Vasculitis		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Vasectomía	Cirugía		
Vejiga, infección	Infección general		
Venéreas, enfermedades	Enfermedades de Transmisión Sexual		
Verruga genital		<b>A CRITERIO : aceptar</b>	Enfermedades de Transmisión Sexual
Verrugas		<b>A CRITERIO : aceptar</b> -incluso si está con tratamiento local	
Vesícula, cirugía	Cirugía		
Vesícula, enfermedad		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - el donante está sintomático - si hay asociación con una anemia hemolítica de causa hereditaria, ej: esfereocitosis <b>A CRITERIO : aceptar</b> - si se ha recuperado o tiene cálculos asintomáticos	- Infección general - Cirugía
Vesícula, infección	Infección general		
Viajes			Riesgo de <i>Enfermedades según Ubicación Geográfica</i> - Malaria - Chagas, enfermedad - Infección tropical - Seguridad de la sangre
VIH, infección		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
VIH, pareja sexual actual de caso confirmado		<b>OBLIGATORIO : no debe donar</b>	- Seguridad de la sangre
VIH, pareja sexual antigua de caso confirmado		<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - han transcurrido menos de 12 meses desde el último contacto sexual	- Seguridad de la sangre
Virales, enfermedades	Infección general	<b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b> - cualquier sitio infectado de manera secundaria no ha sanado todavía - han transcurrido menos de 8 semanas desde la aparición de un sitio de infección secundario	
<b>Viruela, contacto</b>		<b>A CRITERIO : aceptar</b> - si no hay nuevas lesiones en la piel  <b>INFORMACION ADICIONAL :</b> Los contactos cercanos de los vacunados de viruela pueden desarrollar sitios secundarios de infección al tomar su piel contacto directo con el sitio de inoculación o con la ropa, sábanas, vendas, etc. Si se produce infección aparece un eritema, una ampolla o una irritación en el lugar de contacto. Este representa un sitio de vacunación secundario y tiene el mismo riesgo potencial para otros donantes, personal y pacientes que una persona recientemente vacunada.	



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Viruela, vacunación		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el sitio de inoculación no ha sanado completamente</li> <li>- cualquier sitio de infección secundario no ha sanado completamente</li> <li>- han transcurrido menos de 8 semanas desde la inoculación o de la aparición de un sitio de infección secundario</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La vacuna contra la viruela es de virus vivo. A las 8 semanas la infección causada por la inoculación debería estar controlada. Si la herida no ha sanado es posible que todavía haya un grado de infección presente y existe el riesgo de traspasar el virus u otra infección a donantes, al personal o a receptores de sangre o tejidos.</p>	




CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Vitaminas, tratamiento</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b>  - han sido indicadas para tratar una deficiencia</p> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b>  - si es automedicación oral o indicadas para prevenir una deficiencia</p> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b>  Las personas que están en tratamiento por una deficiencia vitamínica no deben donar aun cuando cumplan con los niveles de hemoglobina. Una vez completado el tratamiento deberán ser aceptados o rechazados sobre la base de la enfermedad subyacente que hizo requerir el tratamiento.  Las vitaminas a menudo son indicadas para prevenir una deficiencia. Esto puede ser en enfermedad celíaca, o para personas en tratamiento para quedar embarazadas. En este caso, cuidando que no hay una condición subyacente causante de rechazo, el donante debe ser aceptado.</p>	
Vitiligo	Autoinmune, enfermedad		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>Volumen sanguíneo, estimación</p>		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>todos los donantes</i>, excepto los que donan 2 GR si el volumen estimado de sangre es menor de 3,8 litros</li> <li>- <i>donantes de 2 GR</i> si volumen sanguíneo estimado es menor de 5 litros</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>Se recomienda que los donantes no pierdan más del 13% de su volumen sanguíneo durante el proceso de donación. Esto es para protegerlos de reacciones adversas como desmayos y anemia. Hay un peso mínimo necesario para aceptar la donación, pero no siempre es apropiado, especialmente en la donación de 2 glóbulos rojos aunque también en la extracción de rutina en la que el volumen se ha aumentado.</p> <p>La obesidad también hace aconsejable usar otros parámetros además del peso. La grasa contiene proporcionalmente mucho menos sangre que el músculo. En individuos obesos el volumen sanguíneo puede ser sobreestimado si se basa sólo en el peso.</p> <p>Sobreestimar el volumen sanguíneo de un donante aumenta la posibilidad que tenga una reacción adversa.</p>	<p>- Peso</p>
<p>Von Recklinghausen, enfermedad de</p>	<p>Neurofibromatosis</p>		
<p>Von Willebrand, enfermedad de</p>	<p>Coagulación, trastornos</p>		
<p>Vuelos</p>	<p>Actividades peligrosas</p>		
	<p>Viajes</p>		



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
<p>West Nile, virus (WNV) o Virus del Nilo Occidental (VNO)</p>		<p><b>DEFINICION :</b> las áreas afectadas - <i>Riesgo de Enfermedades según Ubicación Geográfica</i></p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- han transcurrido menos de 6 meses desde el regreso de una zona endémica y el donante fue diagnosticado con WNV o tuvo síntomas sugestivos, ya sea durante su estadía o al regreso</li> <li>- han transcurrido menos de 4 semanas desde el regreso de una zona endémica</li> </ul> <p><b>A CRITERIO : aceptar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a todos los donantes después de 6 meses de su regreso de un área endémica. Este plazo se puede reducir a 4 semanas si no hubo síntomas ni evidencias de infección.</li> <li>- si regresó hace menos de 4 semanas, no tuvo síntomas ni evidencias de infección y un test validado de NAT para WNV es negativo.</li> </ul> <p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>El West Nile virus es un flavivirus similar al Dengue, que causa un amplio espectro de infecciones que van desde ningún o mínimos síntomas hasta la muerte. Está extendido geográficamente, pero en los últimos años ha alcanzado proporciones de epidemia en Norteamérica, donde ha causado enfermedades y muerte post transfusión y post trasplantes de tejidos y de órganos.</p>	<p><i>Riesgo de Enfermedades según Ubicación Geográfica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malaria</li> <li>- Chagas, enfermedad</li> <li>- Infección tropical</li> </ul>



CAUSA DE EXCLUSIÓN	DIRIGIRSE A	DECISION A TOMAR	VER, SI CORRESPONDE
Wilson, enfermedad de		Se disemina por mosquitos y por lo tanto es de mayor prevalencia en la época que los mosquitos están activos. como en la época del año, no se puede establecer un área de la cual los donantes deban ser rechazados y fechas de actividad de la enfermedad. Estos se entregan en el Geographical Disease Risk Index	
Xenotransplante		<p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p> <p><b>DEFINICION:</b> todo procedimiento que involucre transplantar, implantar o infundir en un receptor humano, células vivas, tejidos u órganos desde una fuente animal no humana; también se refiere a fluidos humanos; células, tejidos u órganos que han tenido contacto ex vivo con células, tejidos u órganos vivos de animales no humanos.</p> <p>Los productos biológicos, drogas o dispositivos médicos extraídos de células, tejidos u órganos no vivos de animales no humanos, incluyendo la insulina porcina y las válvulas cardíacas porcinas, no se consideran productos de xenotransplante.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar si</b></p> <p>- se ha puesto en contacto con la sangre del donante, directa o indirectamente, material proveniente de una fuente animal no humana viva. Esto no incluye las mordeduras animales.</p> <p><b>OBLIGATORIO : no debe donar</b></p>	
Xenotransplante - pareja sexual de receptores (actual o anterior)		<p><b>INFORMACION ADICIONAL :</b></p> <p>La exposición a material animal no humano, especialmente cuando la persona es inmunosuprimida puede resultar en infecciones que normalmente no afectarían humanos.</p>	





<b>CAUSA DE EXCLUSIÓN</b>	<b>DIRIGIRSE A</b>	<b>DECISION A TOMAR</b>	<b>VER, SI CORRESPONDE</b>
Yeso	Accidente		