Bloodchip ID
Aplicaciones de la
Biología Molecular en
Banco de Sangre

CHILE, JULIO 2014

BLOOD TYPING SOLUTIONS
Compatible with you

GRIFOLS

Sumario

- ✓ Medicina transfusional – Pruebas pre transfusionales
- ✓ Limitaciones de la Serología
- ✓ Genotipado Molecular – métodos
- ✓ Beneficios del Genotipado Molecular
- ✓ Bloodchip – solución para el Genotipado Molecular
- ✓ BIDS XT – software de gestión del genotipado Molecular

Medicina Transfusional

Pruebas pre-transfusionales

- En la actualidad, es **obligatorio y necesario** llevar a cabo pruebas pre-transfusionales de compatibilidad antes de empezar cualquier transfusión sanguínea.
- **Objetivo:** Seleccionar la sangre o componentes sanguíneos más seguros para el receptor con el fin de evitarle cualquier daño.

Pruebas pretransfusionales: tipos

- Tipaje ABO (Grupo hemático y sérico)
- Tipaje Rh
- Investigación de anticuerpos
 - ✓ Escrutinio de anticuerpos
 - ✓ Identificación de anticuerpos
 - ✓ Titulación de anticuerpos
- Prueba cruzada
- Fenotipo extendido
- Coombs directo
- Autocontrol
- Técnicas de biología molecular:
Genotipado

Limitaciones de serología I

Limitaciones técnicas

- Los reactivos de serología, si están disponibles, son caros y poco fiables.
- Muchos antisueros utilizados no tienen aprobación CE / FDA
- El análisis de antígenos menos frecuentes mediante métodos manuales, laborioso y excesivo tiempo.
- Los antisueros están individualizados.
- Interpretación subjetiva en expresiones débiles
- Los antisueros no siempre reaccionan con antígenos de baja inmunogenicidad o de baja expresión génica

Limitaciones de serología II

Limitaciones clínicas

- Pacientes multitransfundidos (Talasemias, enfermedad de células falciformes; SCD, anemia hemolítica autoinmune, anemias refractarias, drepanocitosis, oncohematológicas)
- Pacientes con prueba de la antiglobulina directa positiva.
- Pacientes recientemente transfundidos
- Pacientes con autoanticuerpos
- Determinar la zigosidad RHD en individuos D-positivos
- Limitación registros donantes antígeno-negativo o perfiles “raros”
- Estudio prenatal: predecir profilaxis de RhIg y el riesgo HDFN , TFNA

Cuando la serología no es suficiente

Sólo existe un vía disponible

Genotipado molecular

01.

Genotipado de Grupos Sanguíneos

Definición

Utilidad Clínica

Métodos

Genotipado Molecular

- Composición genética de un individuo

¿Cómo nos fijamos en los genes?

Métodos

PCR convencional

Extracción DNA/RNA

Amplificación

Detección

Polymperase Chain Reaction (AMPLIFICACIÓN)

Métodos de detección

- Electroforesis en gel de agarose
- Fluorescencia (PCR – tiempo real)

Métodos de detección

microarrays

Array en suspensión

Genotipado de Grupos Sanguíneos

Paciente

DETERMINA EL
VERDADERO
GRUPO SANGUÍNEO

- ✓ DAT+ : warm autoimmune hemolytic anemias
- ✓ Multi-transfused: SCD patients, anemias, aplastic anemias, oncology patients etc.
- ✓ Recently transfused patients
- ✓ Pregnant women
- ✓ Unresolved RhD/RhCE

Donante

SUMINISTRA LA
UNIDAD DE SANGRE
CORRECTA

- ✓ Build a large donor base
- ✓ Find negatives for high-frequency Ag
- ✓ Find rare Ag combinations

Beneficio para los pacientes?

Evita las
complicaciones
aloinmunización

Minimiza las
reacciones
adversas

Evita
aloinmunización

Disminuye el
tiempo de
hospitalización

Aumenta el
tiempo entre la
transfusión

¿Qué sucede en el sitio donante?

Varios antígenos
simultáneamente

Reduce el
tiempo y el costo
para suministrar
unidades

Reduce el
tiempo operativo

Base de datos
de donantes

No requiere
elevado
conocimiento
técnico

Antisueros
pueden ser
caros

BLOODchip^{ID}

- IVD tests
- Main allelic variants of:

Bloodchip[®] es un test de biología molecular a gran escala diseñado para ser incorporadas en laboratorios de Transfusión Sanguínea y Centros de Donación de Sangre.

La genotipificación del grupo sanguíneo permite mejorar la seguridad en la transfusión sanguínea a través de estudios de compatibilidad más extensos entre los perfiles antigénicos de donante y de los hematíes de receptor.

La identificación genética es el método de rutina más ampliamente utilizado para el estudio de las variantes sanguíneas clínicamente más relevantes relacionadas con la Medicina Transfusional.

Genotipificación de pacientes

Genotipificación de donantes

Genotipificación de gestantes

EQUIPOS ESENCIALES REQUERIDOS

TERMOCICLADOR PARA LA AMPLIFICACIÓN DEL DNA

- Gold plated 96-well GeneAmp® PCR system 9700 (AB)
- Aluminium plated 96-well GeneAmp® PCR system 9700 (AB)
- Veriti® Dx 96-Well(AB)
- Veriti® 96-Well(AB)

CITOMETRO DE FLUJO

- Luminex® 100/200™ System
- Softwares: Luminex IS100 2.3 or xPONENT 3.1

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL KIT

IDCORE^{XT}

31 *POLIMORFISMOS* (33 antígenos) analizados:

CONTENIDO 1 kit: 48 determinaciones/kit

VELOCIDAD DE PROCESADO: hasta 96 muestras/análisis, 30 minutos manipulación manual, 4,5 horas de tiempo de procesado

BLOOD GROUPS	GENOTYPES	PHENOTYPES (Antigens)
RhCE	Cw, C, c, E, e, r's, ceAR, V*, hrB*, hrS*	Cw, C, c, E, e, VS, V*, hrB*, hrS*
Kell	K, k, KPA, KPB, JSA, JSB	K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb
Kidd	JKA, JKB, Jknull (IVS5-1G>A), Jknull(871T>C)	Jka, Jkb
Duffy	FYA, FYB, FyGATA, Fyx	Fya, Fyb
MNS	M, N, S, s, GYPB del, GYPB(230C>T), GYPB(IVS5+5G>T), GpMur	M, N, S, s, U, Mia
Diego	DIA, DIB	Dia, Dib
Dombrock	DOA, DOB, HY, JO	Doa, Dob, Hy, Joa
Colton	COA, COB	Coa, Cob
Cartwright	YTA, YTB	Yta, Ytb
Lutheran	LUA, LUB	Lua, Lub

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL KIT

IDHPA^{XT}

TIPO CELULAR	GRUPO PLAQUETAR	GENOTIPO	FENOTIPO PREDICHO
PLAQUETAS	HPA 1	HPA1a, HPA1b	HPA1a, HPA1b
	HPA 2	HPA2a, HPA2b	HPA2a, HPA2b
	HPA 3	HPA3a, HPA3b	HPA3a, HPA3b
	HPA 4	HPA4a, HPA4b	HPA4a, HPA4b
	HPA 5	HPA5a, HPA5	HPA5a, HPA5
	HPA 6	HPA6a, HPA6bw	HPA6a, HPA6bw
	HPA 7	HPA7a, HPA7bw	HPA7a, HPA7bw
	HPA 8	HPA8a, HPA8bw	HPA8a, HPA8bw
	HPA 9	HPA9a, HPA9bw	HPA9a, HPA9bw
	HPA 10	HPA10a, HPA10bw	HPA10a, HPA10bw
	HPA 11	HPA11a, HPA11bw	HPA11a, HPA11bw
	HPA 15	HPA15a, HPA15b	HPA15a, HPA15b

13 POLIMORFISMOS (12 Antígenos Plaquetarios)

analizados:

HPA 1-11 y HPA 15

CONTENIDO 1 kit: 48 determinaciones/kit

*VELOCIDAD DE PROCESADO: hasta 96 muestras/test,
30 minutos manipulación manual, 4,5 horas de
tiempo de procesado*

PROCEDURE OVERVIEW

Luminex - Tecnología XMAP

ID-CORE XT™ RUO utiliza tecnología Luminex xMAP® basada en microesferas.

SEM photo of 3.4 micron particles on human hair, 1000x

- > 5.6 micron, microesferas de poliestireno
- > Superficie Carboxilada

- > Microesferas
 - > Suspensión en medio líquido
 - > Cinética rápida

Tecnología

- **Tecnología xMAP : 100 conjuntos de distintas microesferas coloridas**
 - Utilizamos una combinación de dos colorantes para distinguir un conjunto de microesferas de otro
 - Basado en proporciones de colorantes, cada conjunto de microesferas exhibe una fluorescencia única en rojo e infrarrojo
 - Todas las microesferas que tienen una relación de color particular, pertenecen a un conjunto de microesferas específico que es identificado por número de identificación único

ACOPLAMIENTO

Son acopladas moléculas biológicas de captura en la superficie de la microesfera a través de reacciones químicas.

IDCORE^{XT}

IDHPA^{XT}

Principio del teste – Bloodchip ID

Protocolo

MUESTRA

DNA genómico extraído de la sangre EDTA

DNA is our starting material

→
DNA
extraction

AMPLIFICACIÓN

DNA genómico extraído de la sangre EDTA es amplificado y biotinilado por multiplex PCR

+

HotStarTaq® DNA
polymerase

Amplification

HYBRIDIZACIÓN

Productos de PCR son desnaturalizados y hibridados con probes de oligonucleótidos acopladas a microesferas codificadas por color.

HYBRIDIZACIÓN

HOMOZYGOUS HPA1A/1A

HYBRIDIZACIÓN

HETEROZYGOUS HPA1A/1B

HYBRIDIZACIÓN

HOMOZYGOUS HPA1B/1B

MARCAJE

DNA hibridado es marcado con conjugado fluorescente.

MARCAJE

SAPE binds to biotin

DETECCIÓN DE LA SEÑAL

La señal resultante es detectado a través del sistema Luminex® 100/200™.

CUANTIFICACIÓN

Coloración
Rojo/Infrarrojo :
Identificación de
microesferas

fluorescencia verde:
Cuantificación da la
razón de hibridación

Ambos señales
permiten la
detección de la
presencia/ausencia
de un polimorfismo

Interrogate label
with green laser
(525 nm)

Interrogate bead
with red laser
(635 nm)

Quantify binding
events

Identify bead region
based on internal dye
concentrations

SEÑAL DETECTADO POR LUMINEX

What bead type is it? Dark or light red?

Is there SAPE signal?

“Beads on a string”

Bead type 1 (HPA 1a)

→ No SAPE signal

BEAD COUNTS

MFI signal

Bead type 2 (HPA 1b)

→ SAPE signal

Sample is HPA1b/1b

ANALISIS DEL RESULTADO

BLOODchip ID Software XT (BIDS XT) :

Utiliza la MFI y cuentas de beads obtenidas en el ensayo para la determinación del genotipo para cada uno de los polimorfismos detectados por el teste.

BIDS^{XT}

BLOODchip[®] ID software

BIDS XT v.1.0 Client

PROGENIKA

BIDS XT
BLOODchip Software

Tests summary

BATCH ID	TEST ID	SAMPLE ID	CONTROL...	CONTRO...	PRODUC
2013_01_23_0001	ID-CORE_XT_alella_0001	alella			ID-CO
2013_01_23_0001	ID-CORE_XT_masnou_0001	masnou			ID-CO
2013_01_23_0001	ID-CORE_XT_montgat_0001	montgat			ID-CO
2013_01_23_0001	ID-CORE_XT_tiana_0001	tiana			ID-CO
2013_01_23_0001	ID-CORE_XT_NEG_H2O_0001		NEG	H2O	ID-CO
2013_01_23_0003	ID-CORE_XT_alella_0002	alella			ID-CO
2013_01_23_0003	ID-CORE_XT_masnou_0002	masnou			ID-CO
2013_01_23_0003	ID-CORE_XT_montgat_0002	montgat			ID-CO
2013_01_23_0003	ID-CORE_XT_tiana_0002	tiana			ID-CO
2013_01_23_0003	ID-CORE_XT_NEG_H2O_0002		NEG	H2O	ID-CO
2013_01_23_0004	ID-HPA_XT_alella_0001	alella			ID-HF

Page 1 of 3 | Displaying 1 - 25 of 66

Batches summary

BATCH ID	STATUS	CREATION...	COMMENTS	PRODUCT
2013_02_07_0002	Pending	07/02/2013		
2013_02_07_0001	Pending	07/02/2013		
2013_01_31_0002	Pending	31/01/2013		
2013_01_31_0001	In process	31/01/2013		
2013_01_26_0001	Pending	26/01/2013		
2013_01_24_0001	Pending	24/01/2013		
2013_01_23_0006	Pending	23/01/2013		
2013_01_23_0005	Pending	23/01/2013		
Batch mixto	Completed	23/01/2013	Prueba numero 1	
2013_01_23_0004	Discarded	23/01/2013		

Page 1 of 1 | Displaying 1 - 10 of 10

Last logged in users

Last login	User name
18/02/2013	Grifols
14/12/2012	PGK
04/06/2012	admin

Luminex maintenance

Applied?	Date	User name	Action type	Message
----------	------	-----------	-------------	---------

Last performed controls

Batch Id.	Creation date	Product Id.	Control type	Control Id.
Batch mixto	23/01/2013	ID-HPA XT	NEG	H2O
Batch mixto	23/01/2013	ID-CORE XT	NEG	H2O

Available kits

Logged in **Grifols** BIDS XT version: **1.1** Analysis software **ID-HPA XT 1.3.1** **ID-CORE XT 1.2.1** Server connection status **CONNECTED** Luminex connection status **Disconnected**

Batch #: Batch mixto
Date: 23/01/2013

DNA Extraction

Amplification

Hybridization

Labeling

Quantification

Results

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
B	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
C	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
D	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
E	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
F	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
G	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										
H	✓ ID-HPA X ID-CORE XT	✓ ID-HPA X ID-CORE XT										

Kits

Kit Id.	Product Id.	Lot #	Expiration date	First use date	Remaining tests
118	ID-CORE XT	0201021111	✓ 07/2013	23/01/2013	35

Enzymes

Enzyme Id.	Name	Lot #	Volume (µl)
1	HotStarTaq DNA Poly...	123232345	0.5
1	HotStarTaq DNA Poly...	222222222	0.5

Components

Product	Kit #	Tests #	Lot #	Reagent
ID-CORE XT	0201021111	8	0201021111	ID-CORE XT PCR Mas
ID-HPA XT	0101031234	8	0101031234	ID-HPA XT PCR Mas

Guidelines

- Turn on the thermocycler
- Set up the PCR reaction following the table
- Vortex the PCR reaction and dispense 20 µL per sample in each well
- Add 5 µL of each DNA sample per well
- Seal and spin down the PCR plate and place it in the thermocycler
- Select the ID ID XT PCR program in the thermocycler

Logged in **Grifols** BIDS XT version: **1.1** Analysis software **ID-HPA XT 1.3.1** **ID-CORE XT 1.2.1** Server connection status **CONNECTED** Luminex connection status **Disconnected**

BIDS XT v.1.0 Client

PROGENIKA

BIDS XT
BLOODchip Software

Batch #: Batch mixto
Date: 23/01/2013

Test Id.
ID-HPA_XT_teia_0001
ID-HPA_XT_arenys_0001
ID-HPA_XT_palamos_0001
ID-HPA_XT_st antoni_0001
ID-HPA_XT_blanes_0001
ID-HPA_XT_calella_0001
ID-HPA_XT_pals_0001
ID-HPA_XT_NEG_H2O_0001
ID-CORE_XT_teia_0001
ID-CORE_XT_arenys_0001
ID-CORE_XT_palamos_0001
ID-CORE_XT_st antoni_0001
ID-CORE_XT_blanes_0001
ID-CORE_XT_calella_0001
ID-CORE_XT_pals_0001
ID-CORE_XT_NEG_H2O_0003

SNP representation

Batch mixto SNP 48 x 1

SNP
48
87
88
89
90
91
92
93
96
97
100
101
102
103
104
105

Test Id.	Location	MFI 1	MFI 2	Comments
ID-CORE_XT_teia_00...	A02	0.0	1.0	
ID-CORE_XT_arenys...	B02	4.0	3.0	
ID-CORE_XT_palamo...	C02	0.0	3.0	
ID-CORE_XT_st anto...	D02	3.0	4.0	
ID-CORE_XT_blanes_...	E02	0.0	3.0	
ID-CORE_XT_calella_...	F02	3.0	2.0	
ID-CORE_XT_pals_00...	G02	4.0	4.0	
ID-CORE_XT_NEG_H...	H02	1.0	4.0	

results

Grifols

Logged in Grifols BIDS XT version: 1.1 Analysis software ID-HPA XT 1.3.1 ID-CORE XT 1.2.1 Server connection status CONNECTED Luminex connection status Disconnected

REPORT

IDCORE^{XT}

Red Blood Cells typing report

Date: 18/07/2013 12:15:25 User: Gritols

#:	RBC4 (OR1R2)	Ordering institution:	Progenika Biopharma S.A
Sample Id.:	RBC4	Test performed:	ID-CORE XT
Sample type:	DNA	Software version:	1.3.1
Accessioning date:	16/04/2013	Lot #:	0201030003
		Enzyme lot #:	142342293

Blood Group System	Alleles Assayed	Genotype Result	Antigens (ISBT Phenotype)	Predicted Phenotype Result
Rh	RHCE*ce	RHCE*Ce	C (RH:2)	+
	RHCE*Ce		E (RH:3)	0
	RHCE*cE		c (RH:4)	0
	RHCE*CE		e (RH:5)	+
	RHCE*CeCW		CW (RH:8)	0
	RHCE*ceCW		V (RH:10)	0
	RHCE*CECW		h _r S (RH:19)	+
	RHCE*ceAR		VS (RH:20)	0
	RHCE*CeFV		h _r B (RH:31)	+
	RHCE*CeVG			
	RHCE*cEFM			
	RHCE*ce[712G]			
	RHCE*ce[733G]			
	RHCE*ce[733G,1006T]			
RHCE*CE-[D]2, 5, 7]-CE				
RHCE*CE[697G,712G,733G]				
RHD*r's-RHCE*ce[733G,1006T]				
Kell	KEL*k_KPB_JSB	KEL*k_KPB_JSB	K (KEL:1)	0
	KEL*k_KPB_JSB		k (KEL:2)	+
	KEL*k_KPA_JSB		Kpa (KEL:3)	0
	KEL*k_KPB_JSA		Kpb (KEL:4)	+
			Jsa (KEL:6)	0
			Jsb (KEL:7)	+
Kidd	JK*A	JK*A, JK*B	Jka (JK:1)	+
	JK*B		Jkb (JK:2)	+
	JK*B_null[IVS5-1a] JK*B_null[871C]			
Duffy	FY*A	FY*B	Fya (FY:1)	0
	FY*B		Fyb (FY:2)	+
	FY*B_GATA FY*B[265T]_FY*X			
MNS	GYP*A*M	GYP*A*M, GYP*A*N	M (MNS:1)	+
	GYP*A*N		N (MNS:2)	+
	GYPB*s	GYPB*s	S (MNS:3)	0
	GYPB*s		s (MNS:4)	+
	GYPB*s_null[IVS5+5t]		U (MNS:5)	+
	GYPB*s_null[230T]		Mia (MNS:7)	0
	GYPB*deletion			
GYPB*Mur				

REPORT

Blood Group System	Alleles Assayed	Genotype Result	Antigens (ISBT Phenotype)	Predicted Phenotype Result
Diego	<i>D^IA</i>	<i>D^IB</i>	Dia (DI:1)	0
	<i>D^IB</i>		Dib (DI:2)	+
Dombrock	<i>DO^AA</i>	<i>DO^BB</i>	Doa (DO:1)	0
	<i>DO^BB</i>		Dob (DO:2)	+
	<i>DO^BB_{HY}</i>		Hy (DO:4)	+
	<i>DO^AA_{JOA}</i>		Joa (DO:5)	+
Colton	<i>CO^AA</i>	<i>CO^AA</i>	Coa (CO:1)	+
	<i>CO^BB</i>		Cob (CO:2)	0
Cartwright	<i>YT^AA</i>	<i>YT^AA</i>	Yta (YT:1)	+
	<i>YT^BB</i>		Ytb (YT:2)	0
Lutheran	<i>LU^AA</i>	<i>LU^AA LU^BB</i>	Lua (LU:1)	+
	<i>LU^BB</i>		Lub (LU:2)	+

Legend

+: Normal antigen expression
 0: Undetectable antigen expression
 NC: No Call, result inconclusive
 UN: Unknown, highly unlikely. The antigen expression is not known.

Notes

Recommendations

We recommend that the test should always be interpreted within the clinical context of the donor/patient as well as serology data

Observations

REVIEW AND APPROVAL

Progenika

Progenika

Conclusiones

El genotipaje de grupos sanguíneos utilizando BloodChip proporciona resultados fiables en la predicción del fenotipo eritrocitario y plaquetario permitiendo:

- 1- Mejorar la disponibilidad de productos sanguíneos extensivamente tipificados (base amplias de donantes) para seleccionar unidades compatibles a pacientes dependientes transfusión.
- 2- Evitar o reducir la aloinmunización frente a antígenos de grupo sanguíneo
- 3- Reducir la incidencia de reacciones hemolíticas retardadas

BLOODchip Base Instalada

Installed Systems 44

Service Customers 65

Gracias!