



EOSINOFILIA



REVISIÓN DE CASOS DETECTADOS POR 40 AÑOS EN EL SERVICIO HEMATOLOGÍA COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO (SHCABL)

Cordero F**, Vega C**, Osorio G***, Ruz S*, Leiva I*, Navia V*, Corvalán I**


Internos Medicina U. de Chile, **Becados Medicina U. de Chile, ***Jefe Servicio Medicina CA

Definición: Corresponde al aumento del recuento de eosinófilos en sangre periférica, en rango leve a moderado, cuyas etiologías pueden ser divididas en primarias, secundarias o idiopáticas (incluye Sd. hipereosinofílico), con escasos reportes en la literatura.

Objetivos: Describir características demográficas, causas, severidad y duración de eosinofilia a nivel nacional.


Objetivos y métodos: Estudio retrospectivo, realizado de la búsqueda de casos con eosinofilia en un total de 2380 fichas clínicas del SHCABL, entre los años 1964-2005. Se consideró eosinofilia al recuento absoluto de eosinófilos > 600 y enfermedad asociada aquella que causa eosinofilia. Se consignaron variables demográficas, meses de evolución, recuento absoluto y relativo eosinófilos, gravedad de la enfermedad (leve 600 - 1500, moderado 1501 - 5000, severo > 5000) y enfermedades asociadas. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 8.0.

Resultados: La prevalencia de eosinofilia en SHCABL es del 14,3%; 1,4 por cada 10 casos hematológicos controlados.






(sin diferencia estadística significativa para sexo y edad p > 0,05)

- ✓ Duración promedio fue 9,5 meses (DS 24), con un rango de 1-210 meses.
- ✓ Los recuentos absolutos promedio fueron de 15400 (DS 2277,9), con rango entre 600 y 17040.



En un total de 342 casos se consignó los datos de 282 casos.



Conclusiones: La eosinofilia es una alteración que va en aumento, probablemente debido a la mayor solicitud de hemogramas que la evidencian, así como a neoplasias de origen hematológico y no hematológico de enfermedades alérgicas. No presenta diferencias por sexo ni edad, la mayoría es gravedad leve, con un rango de tiempo variable según etiología. La importancia de esta revisión radica en corresponder

La edad promedio diagnóstico fue 46,7 años (DS 20,9),