

Linfoma del manto: Una entidad de presentación pleomorfica.

Conte G*, Araos D, González N, Figueroa G, Celada J, Moyano L.

Sección de Hematología, Unidad de Hematología Oncológica y Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: El linfoma del Manto es una neoplasia linfoide de células B maduras de bajo grado y elevada mortalidad. Clínicamente se caracteriza por presentarse en pacientes mayores, en estadios Ann Arbor avanzados y con frecuente afectación extranodal. El pronóstico se establece con el score MIPI. Se estudia las características epidemiológicas, formas de presentación, compromiso extranodal y estadio MIPI del linfoma del manto.

Metodos: Revisión de fichas clínicas, estudios de citometría de flujo y biopsias de médula ósea, linfonodos y otros tejidos de pacientes diagnosticados de linfoma del manto.

Resultados: Se recopiló información de 8 pacientes, 5 de sexo masculino, con edad promedio 66 años. La forma de presentación al diagnóstico fue polisintomática: síntomas B (5), poliadenopatías (5), síntomas digestivos (4), síntomas respiratorios (4), astenia (3), síntomas rinosinusales (1). Siete pacientes se encontraron en estadio IV-B Ann Arbor al diagnóstico y sólo uno en estadio II-A. Cinco pacientes se encontraron en estadio MIPI-3 y 3 en MIPI-2. El compromiso extranodal se objetivó en 4 pacientes mediante biopsia: 3 pacientes con compromiso digestivo (2 estómago y duodeno, 1 estómago, duodeno y colon) y 1 con compromiso de rinofarinx y pulmonar. Se obtuvieron 2 biopsias ganglionares, 1 con patrón de manto y otro con patrón difuso. En 7 pacientes se demostró compromiso de médula ósea por biopsia y citometría de flujo. La mediana de supervivencia de los pacientes fue de 19 meses.

Conclusiones: En esta serie destaca las diversas presentaciones clínicas y la elevada frecuencia de compromiso extramedular, especialmente de tubo digestivo. Esto obliga a una búsqueda protocolizada de enfermedad diseminada, compromiso de médula ósea y enfermedad extranodal. El pronóstico de los pacientes es variable y el score MIPI puede ser útil en la estratificación pronóstica.